


Metingen Luchtkwaliteit in de Leopold II tunnel

Periode Januari 2012 – Maart 2013



Metingen Luchtkwaliteit in de Leopold II tunnel

In uitvoering van het Besluit van 22 december 1994 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, betreffende de luchtkwaliteit in de wegtunnels, aangevuld met de omzendbrief van 9 januari 1997 aangaande de toepassing van voormeld besluit, werden in de loop van het jaar 2002 twee permanente meetposten opgericht in de Leopold II tunnel, één in elke richting.

Het besluit over de luchtkwaliteit in wegtunnels legt de verplichting op om de luchtkwaliteit in tunnels op een meer systematische wijze (permanent) te volgen en de opgelegde grenswaarden zo goed mogelijk te laten respecteren. Dit besluit is een ver gevolg van de resultaten die opgetekend werden bij enkele kortstondige meetcampagnes (telkens ongeveer één week) in diverse tunnels, destijds uitgevoerd door de diensten van het Nationale Ministerie van Volksgezondheid (1989-1992), meer bepaald door de afdeling “Lucht” van het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie (*zie 1, 2, 3 en 4 op volgende bladzijde*).

De meetposten werden door het Bestuur Uitrustingen en Vervoer (BUV) opgericht op basis van een bijzonder bestek, dat opgesteld werd in gemeenschappelijk overleg tussen de “Directie Bijzondere Technieken” van het BUV enerzijds en het Laboratorium voor Milieu-Onderzoek (LMO) van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) anderzijds.

Beide meetposten zijn sedert december 2002 operationeel en zijn uitgerust met continue meetapparatuur voor de detectie van stikstofmonoxide (NO), stikstofdioxide (NO₂) en koolmonoxide (CO). Het LMO staat in voor de dagelijkse opvolging van de resultaten en voor de regelmatige controle en ijking van de meetapparatuur.

Het datasysteem van beide meetposten is verbonden met het centrale beheerssysteem van het “*Telemetrisch Meetnet*” ter controle van de kwaliteit van de omgevingslucht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit meetnet wordt beheerd door het LMO. De resultaten gemeten in de tunnel tijdens de vorige jaarperiodes werden regelmatig gerapporteerd (*zie 5 t/m 13 op volgende bladzijde*).

1. *Luchtverontreinigingsmetingen in de Brusselse tunnels aansluitend op de invalswegen naar het centrum van de stad (IHE - mei 1989).*
2. *Luchtverontreinigingsmetingen in verkeerstunnels. Een evaluatie van de verkeersemisies aan de hand van de koolstofbalans (IHE - juli 1990).*
3. *Studie van de Luchtkwaliteit in twee autowegtunnels die aansluiten op de Antwerpse Ring (IHE - oktober 1991).*
4. *Studie van de Luchtkwaliteit in enkele verkeerstunnels te Brussel (IHE - maart 1992).*
5. *Metingen Luchtkwaliteit in de Leopold II tunnel. Periode "December 2002 – Maart 2004" (BIM-LMO - april 2004).*
6. *Metingen Luchtkwaliteit in de Leopold II tunnel. Periode "Januari 2004 – Maart 2005" (BIM-LMO – mei 2005).*
7. *Metingen Luchtkwaliteit in de Leopold II tunnel. Periode "Januari 2005 – Maart 2006" (BIM-LMO – juli 2006).*
8. *Metingen Luchtkwaliteit in de Leopold II tunnel. Periode "Januari 2006 – Maart 2007" (BIM-LMO – juni 2007).*
9. *Metingen Luchtkwaliteit in de Leopold II tunnel. Periode "Januari 2007 – Maart 2008" (BIM-LMO – juni 2008).*
10. *Metingen Luchtkwaliteit in de Leopold II tunnel. Periode "Januari 2008 – Maart 2009" (BIM-LMO – juli 2009).*
11. *Metingen Luchtkwaliteit in de Leopold II tunnel. Periode "Januari 2009 – Maart 2010" (BIM-LMO – juni 2010).*
12. *Metingen Luchtkwaliteit in de Leopold II tunnel. Periode "Januari 2010 – Maart 2011" (BIM-LMO – juni 2011).*
13. *Metingen Luchtkwaliteit in de Leopold II tunnel. Periode "Januari 2011 – Maart 2012". (Leefmilieu Brussel – juni 2012).*

1. Meetposten

Eén van de meetposten, met codenaam 41LEC1, bevindt zich in het tunnelsegment richting centrum. Het aanzuigpunt van de lucht bevindt zich op enkele honderden meter van het einde van de tunnel, ter hoogte van de hulppost 111. Op deze plaats is er een grote kans op filevorming tijdens de ochtendspits.

De apparatuur werd opgesteld in een technisch lokaal aanpalend aan het tunnelsegment. Het was de bedoeling om de vervuiling van de meetapparatuur door roetdeeltjes zoveel mogelijk te voorkomen en de kans op technische defecten (kortsluiting) te beperken. De apparatuur bevindt zich bovendien in een gesloten kast met temperatuurregeling (koeling/verwarming).

De apparatuur van de andere meetpost, met codenaam 41LEB2, bevindt zich in één van de technische lokalen van het Simoniscomplex. Het aanzuigpunt bevindt zich in het tunnelsegment, richting Basiliek (Koekelberg). Dit meetpunt bevindt zich op meerdere honderden meters van het einde van de tunnel. Gezien de aanwezigheid van verkeerslichten aan het einde van de tunnel kunnen de gevolgen van de filevorming zich tot op deze plaats laten gevoelen, b.v. tijdens een drukke avondspits.

In beide meetposten wordt lucht vanuit de tunnel aangezogen via een teflonleiding van ca. 1 inch diameter. In de meetkast bevindt zich een verdeelsysteem (manifold) waarop meerdere apparaten kunnen aangesloten worden. Op de vertakkingen van het verdeelsysteem zijn filterhouders uit teflon gemonteerd met interne teflonmembraanfilter. De aangezogen lucht gaat vervolgens via soepele teflonleidingen (1/4 inch of 6 mm) naar de ingang van de meettoestellen. Op deze wijze wordt getracht om de inwendige vervuiling van de aanzuigleiding en van de meettoestellen (kleppen, detectiekamer, leidingen, ...) tot een minimum te beperken. De teflonmembraanfilters dienen regelmatig vervangen te worden; de frequentie hiervan is afhankelijk van de totale lading op de filter.

2. Meetprogramma

De meetposten zijn uitgerust met continue meetapparatuur voor de detectie van stikstofoxiden (NO en NO₂) en koolmonoxide (CO). Hierna volgen het type toestel en het bijhorende detectieprincipe:

NO _x	NO _x -API 200	chemiluminescentie
CO	CO-API 300	gasfiltercorrelatie-IR-absorptie (GFIR)

De apparatuur werd eerst gedurende enkele maanden (juni – september 2002) grondig uitgetest in het laboratorium van het LMO, dat de gemeenschappelijke ijkbank van de drie gewesten huisvest. Bij deze testen werd vooral aandacht besteed aan de lineariteit, de stabiliteit, de reproduceerbaarheid en de nauwkeurigheid van de meettoestellen. Er werd in het bijzonder aandacht besteed aan de nauwkeurige detectie van een hoeveelheid NO₂ van enkele honderden µg/m³ in aanwezigheid van enkele duizenden µg/m³ NO.

Er werd bovendien gestreefd naar een ideale technische afstelling van de apparaten zodat, in overeenstemming met de opgelegde specificaties, een optimaal compromis bereikt werd tussen enerzijds een voldoende grote nauwkeurigheid en anderzijds een voldoende hoge responssnelheid van het detectiesignaal.

Na de testperiode in het labo werden de meettoestellen ingebouwd in de meetposten, samen met de bijhorende testapparatuur en de lokale computer. Beide meetposten waren vanaf december 2002 volledig operationeel. Met de bijhorende testapparatuur wordt op regelmatige basis een interne (intern aan de meetpost) ZERO en SPAN controletest uitgevoerd.

De datasystemen van beide meetposten zijn aangesloten op het centrale beheerssysteem van het telemetrisch meetnet ter controle van de luchtkwaliteit (Brussels Hoofdstedelijk Gewest). De meetposten worden opgevolgd naar analogie met de meetposten voor de controle van de kwaliteit van de omgevingslucht, die zich bovengronds bevinden: repatriëring van de meetwaarden om het uur, uitvoeren van regelmatige Zero- en Spantesten (interne controle om de 2 of 3 dagen), overdracht van de halfuursgegevens naar de databank voor “immissiegegevens lucht” van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, etc... . Tijdens de eerste jaarperiode werden de meettoestellen bovendien om de drie maanden ter plaatse gecontroleerd met behulp van externe ijkstandaarden. Vanaf de tweede jaarperiode gebeurde deze bijkomende controle om de zes maanden en thans jaarlijks.

Met het oog op de controle van het naleven van de opgelegde grenswaarden, worden in de meetposten van de tunnel ook de minuutgemiddelden en de voortschrijdende 20-minuutsgemiddelden bewaard en overgeheveld naar het centrale beheerssysteem. Het voortschrijdend 20-minuutsgemiddelde is het gemiddelde over de laatste 20 minuten, dat elke minuut opnieuw wordt berekend.

Op jaarbasis worden voor de beide meetposten heel wat gegevens bewaard. In beide posten is een CO- en een NO_x-apparaat opgesteld. Per meetpost worden resultaten gemeten voor 4 parameters: CO, NO, NO₂ en NO_x. Dit betekent in totaal 8 parameterreeksen, waarvoor op jaarbasis (365 dagen) 140.160 halfuurswaarden worden bewaard (of 140.544 halfuurswaarden voor 366 dagen).

Voor ieder van de 8 gemeten parameters worden ook twee reeksen minuutwaarden bewaard: de minuutgemiddelden en de voortschrijdende 20-minuutsgemiddelden. Voor een volledige jaarperiode (365 dagen) worden er 8.409.600 minuutwaarden bewaard.

**Tabel I - aantal POLLUTIEPARAMETERS,
aantal HALFUURSWAARDEN en MINUUTWAARDEN in de tunnel**

Jaar	Parameters Halfluurswaarden	Halfluurswaarden	Parameters Minuutwaarden	Minuutwaarden
365 dagen	8	140.160	8 * 2	8.409.600
366 dagen	8	140.544	8 * 2	8.432.640

3. Reglementering

Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (22 december 1994), betreffende de luchtkwaliteit in wegtunnels, vermeldt grenswaarden voor CO en NO₂ die niet mogen overschreden worden:

- Voor koolmonoxide (CO):
 - o 100 ppm gemiddeld voor de monsterneming en de analysetoestellen in de beschouwde tunnel, voor een maximumblootstelling van een half uur
- Voor stikstofdioxide (NO₂):
 - o 1.000 µg/m³ (microgram per kubieke meter) voor een maximum blootstelling van 20 minuten
 - o 400 µg/m³ (microgram per kubieke meter) voor een blootstelling van één uur
 - o een lineaire variatie tussen de twee hierboven vermelde waarden voor een blootstelling van 20 minuten tot één uur

Hoewel ze gebaseerd zijn op de richtwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie, onderscheiden deze bepalingen zich, op het gebied van hun formulering, van de doelstellingen voor de luchtkwaliteit in de omgevingslucht.

Grenswaarden voor de omgevingslucht geven een concentratieniveau op, gekoppeld aan een middelingstijd, dat hoogstens een aantal maal per jaar mag overschreden worden: b.v. een uurwaarde van 200 µg/m³ NO₂ in de omgevingslucht mag niet meer dan 18 maal per jaar overschreden worden.

Grenswaarden voor de luchtkwaliteit in tunnels koppelen expliciet de duur van de blootstelling aan de opgegeven concentratie. Dit betekent dat de uurwaarde voor NO₂ niet meer dan 400 µg/m³ mag bedragen als er een *effectieve blootstelling* is gedurende één uur.

Steekproefsgewijs kan vastgesteld worden dat het weinig waarschijnlijk is dat bestuurders gedurende één uur opgehouden worden in de Leopold II tunnel. Het komt echter meermaals voor, b.v. tijdens de ochtend- of de avondspits, dat bestuurders gedurende 20 minuten of langer opgehouden worden in deze tunnel. Bij langzaam verkeer of filevorming verhoogt de uitstoot aan NO₂ en CO. De bestuurders verblijven zo het langst op de plaatsen met de hoogste concentraties van deze polluenten.

Voor de lineaire variatie tussen 20 minuten en één uur wordt, om praktische redenen, enkel aandacht besteed aan een blootstelling gedurende een half uur of 30 minuten. Lineaire interpolatie tussen 1.000 µg/m³ voor 20 minuten en 400 µg/m³ voor één uur (60 minuten) levert een grenswaarde op van 850 µg/m³ NO₂ voor een blootstelling gedurende 30 minuten. Periodes van 59 minuten, 58 minuten, ... , 22 en 21 minuten worden buiten beschouwing gelaten.

4. Resultaten

4.1 Grafische evolutie van de meetwaarden

Als voorbeeld worden de resultaten van beide meetposten, opgetekend gedurende een maandperiode, grafisch voorgesteld in de figuren 1 t/m 3. Voor NO₂ wordt de evolutie van de uurwaarden en van de halfuurswaarden in beide meetposten tijdens de maand maart 2013 weergegeven in de grafieken van de figuur 1. De grafiek bovenaan geeft de evolutie weer van de NO₂-uurwaarden en de grafiek onderaan deze van de halfuurswaarden. Een horizontale lijn, over de gehele breedte van de grafiek, geeft de hoogte weer van de grenswaarde voor NO₂:


400 µg/m³ voor een blootstelling gedurende één uur
850 µg/m³ voor een blootstelling van 30 minuten

Op analoge wijze en voor dezelfde maandperiode wordt in de figuren 2 en 3 de evolutie weergegeven van de uurwaarden en halfuurswaarden van respectievelijk NO en CO.

Het verloop van de CO-concentratie wordt weergegeven in mg/m³ (milligram per kubieke meter). Bij 20 °C en 1013 hPa geldt : 1 ppm CO = 1,165 mg/m³ CO.

Als voorbeeld worden de resultaten van de minuutwaarden en van het voortschrijdend 20-minuutsgemiddelde voor NO₂, vastgesteld in beide meetposten op vrijdag 14 september 2012 (grafiek bovenaan) en op vrijdag 19 oktober 2012 (grafiek onderaan), weergegeven in figuur 4.

**NO₂ - UURWAARDEN - TUNNEL LEOPOLD II
MAART 2013**



**NO₂ - HALFUURSWAARDEN - TUNNEL LEOPOLD II
MAART 2013**





Fig. 1: NO₂ - Evolutie van de uurwaarden en de halfuurswaarden tijdens de maand maart 2013
Meetplaats 41LEC1, richting Centrum - Meetplaats 41LEB2, richting Basiliek

**NO - UURWAARDEN - TUNNEL LEOPOLD II
MAART 2013**



**NO - HALFUURSWAARDEN - TUNNEL LEOPOLD II
MAART 2013**





Fig. 2: NO - Evolutie van de uurwaarden en de halfuurswaarden tijdens de maand maart 2013
Meetplaats 41LEC1, richting Centrum - Meetplaats 41LEB2, richting Basiliek

**CO - UURWAARDEN - TUNNEL LEOPOLD II
MAART 2013**



**CO - HALFUURSWAARDEN - TUNNEL LEOPOLD II
MAART 2013**





Fig. 3: CO - Evolutie van de uurwaarden en de halfuurswaarden tijdens de maand maart 2013
Meetplaats 41LEC1, richting Centrum - Meetplaats 41LEB2, richting Basiliek

**NO₂ - 20-Minutes Average - Tunnel Leopold II
Friday 14 September 2012**



**NO₂ - 20-Minutes Average - Tunnel Leopold II
Friday 19 October 2012**




Fig. 4: NO₂ - evolutie minuutwaarden en voortschrijdend 20-minuutsgemiddelde in beide meetposten van de Leopold II tunnel
Vrijdag 14 september 2012 en vrijdag 19 oktober 2012

4.2 Cumulatieve Frequentieverdeling

Voor het kalenderjaar 2012 worden de resultaten van de cumulatieve frequentieverdeling, berekend over alle beschikbare gegevens (*selectie alle dagen – alle waarden van de dag*), weergegeven in de tabellen IV en V. De resultaten worden vergeleken met deze van de vorige kalenderjaren (2003 – 2011). Tabel IV geeft de resultaten weer voor de halfuurswaarden, terwijl de resultaten voor de uurwaarden terug te vinden zijn in tabel V. Aan de linkerkant van elke rij wordt een verwijzing gegeven naar de meetpost (41LEC1 of 41LEB2), de jaarperiode en de gemeten pollutant (NO, NO₂, NO_x en CO). In de rijen worden de resultaten weergegeven van de voornaamste percentielen P30, P50, P70, P80, P90, P95, P98, P99.9 en van het rekenkundig gemiddelde (AM), het geometrisch gemiddelde (GM) en het percentage beschikbare gegevens (Np%).

Voor CO geldt een grenswaarde van 100 ppm (= 116,5 mg/m³) voor een blootstelling gedurende 30 minuten. Over het kalenderjaar 2012 bedraagt de maximale halfuurswaarde voor CO 47,33 mg/m³ in de meetpost 41LEC1 (centrum) en 36,34 mg/m³ in de meetpost 41LEB2 (basiliek). De 99,9^{ste} percentiel bedroeg 20,01 mg/m³ in de meetpost LEC1 en 10,22 mg/m³ in de meetpost LEB2.

Er werd tijdens het jaar 2012 geen enkele overschrijding van de grenswaarde voor CO vastgesteld. In het verleden was er enkel een overschrijding tijdens het jaar 2004 (meetpost LEC1), zoals blijkt uit tabel II, die de maximale halfuurswaarden voor CO van de voorbije jaren weergeeft.

Tabel II - CO - Maximale Halfuurswaarde [in mg/m³]

Jaar	LEC1	LEB2
2003	62.34	32.58
2004	135.69	29.31
2005	69.35	22.81
2006	37.28	21.47
2007	34.40	19.20
2008	39.92	17.16
2009	34.31	24.20
2010	56.31	14.34
2011	40.67	16.93
2012	47.33	36.34

Voor NO₂ geldt een grenswaarde van 400 µg/m³ voor een blootstelling gedurende één uur en een grenswaarde van 850 µg/m³ voor een blootstelling gedurende 30 minuten. Het niveau van 850 µg/m³ bij de halfuurswaarden situeert zich tussen de percentielen P95 en P98 in de meetpost LEC1 en tussen P90 en P95 in de meetpost LEB2. Het aantal overschrijdingen van dit niveau is hoger dan het aantal overschrijdingen vastgesteld in 2008 of 2009, toen telkens ongeveer 2% (LEC1) en 10% van de halfuurswaarden (LEB2), maar minder hoog dan in 2010 of 2011.

Het niveau van 400 µg/m³ bij de uurwaarden situeert zich tussen de percentielen P70 en P80 voor de meetpost 41LEC1 en tussen P30 en P40 voor de meetpost 41LEB2. Dit betekent dat het aantal uurwaarden hoger dan 400 µg/m³ meer dan 30% uitmaakt van het totaal aantal uurperiodes voor de meetpost richting centrum (41LEC1) en meer dan 60% voor de meetpost richting basiliek (41LEB2).

De gemiddelde NO₂-uurwaarde voor het jaar 2012 bedraagt 351 µg/m³ in de meetpost 41LEC1 en 530 µg/m³ in de meetpost richting basiliek (41LEB2). Tussen 2006 en 2010 is de gemiddelde NO₂-concentratie beduidend toegenomen. In 2011 daalt de gemiddelde NO₂-concentratie in beide segmenten, maar ze blijft hoger dan tijdens de periode 2006-2009. In 2012 vallen de niveaus terug tot deze opgetekend in 2007. In tabel III wordt de evolutie weergegeven van de jaargemiddelde NO₂-concentratie in beide tunnelsegmenten, alsook van de gemiddelde concentratie op werkdagen en niet-werkdagen.

Tabel III: NO₂ – Evolutie GEMIDDELDE CONCENTRATIE [in µg/m³]
 UURWAARDEN

Jaar	Jaargemiddelde Alle Dagen		Gemiddelde Werkdagen		Gemiddelde Niet-Werkdagen	
	LEC1	LEB2	LEC1	LEB2	LEC1	LEB2
2003	278	363	297	391	235	302
2004	279	375	298	404	235	309
2005	283	409	305	444	233	333
2006	338	455	365	490	281	379
2007	350	539	375	577	295	456
2008	376	506	404	541	316	425
2009	371	526	398	561	309	448
2010	485	631	513	666	422	550
2011	409	582	440	613	344	519
2012	351	530	373	560	303	465

De tabellen VI (halfuurswaarden) en VII (uurwaarden) geven de resultaten weer van de cumulatieve frequentieverdeling berekend voor alle werkdagen (*selectie alle werkdagen – alle waarden van de dag*). Tabel VIII en IX geven analoge resultaten voor alle niet-werkdagen (*selectie alle niet-werkdagen – alle waarden van de dag*).

Voor alle polluenten zijn de gemeten concentraties *gemiddeld hoger* op *werkdagen* dan op niet-werkdagen. De gemiddelde uurwaarde voor NO₂ op werkdagen bedraagt 373 µg/m³ (41LEC1) en 560 µg/m³ (41LEB2), tegen respectievelijk 303 µg/m³ en 465 µg/m³ op niet-werkdagen.

Tussen 2006 en 2010 is de gemiddelde waarde voor NO₂ op beide meetposten flink toegenomen. In 2011 en 2012 wordt, in vergelijking met 2010, een daling van de gemiddelde concentratie vastgesteld. Deze vaststelling geldt voor de drie verschillende selecties: *alle dagen*, *alle werkdagen* en *alle niet-werkdagen*.

Voor de meetpost richting basiliek (41LEB2) bedraagt het aantal uurwaarden hoger dan 400 µg/m³ meer dan 70% van het aantal uurwaarden op *werkdagen* en iets meer dan 60% van het aantal uurwaarden op *niet-werkdagen*. Voor de meetpost richting centrum (41LEC1) bedraagt dit meer dan 30% van het aantal uurwaarden op *werkdagen* en meer dan 10% van het aantal uurwaarden op *niet-werkdagen*.

De resultaten van de cumulatieve frequentieverdeling van de uurwaarden voor NO₂, CO, NO en NO_x, berekend voor de kalenderjaren 2003 t/m 2012, worden grafisch weergegeven in de figuren 5 t/m 8. De grafiek bovenaan geeft de resultaten weer voor de meetpost richting centrum (41LEC1) en de grafiek onderaan deze voor de meetpost richting basiliek (41LEB2). In elk van de grafieken worden resultaten weergegeven, berekend voor drie verschillende selecties van dagen: de selectie “*alle dagen*” bevindt zich links in de grafiek, de selectie “*alle werkdagen*” in het midden en de selectie “*alle niet-werkdagen*” rechts in de grafiek.

De grafieken van figuur 5 geven aan dat er in beide meetposten hogere NO₂-waarden worden vastgesteld dan tijdens de beginperiode 2003-2005. Op de meetpost richting Basiliek nemen de NO₂-concentraties tot 2010 duidelijk toe. Voor 2011 en 2012 worden, op sommige hogere centielen na (P98), lagere concentraties vastgesteld dan in 2010. Voor CO komt er voorlopig een einde aan de dalende tendens.

De evolutie van de maandgemiddelde concentraties voor NO₂ en NO wordt weergegeven in de grafieken van figuur 9 en deze voor NO_x en CO in de grafieken van figuur 10. Het betreft de maandgemiddelden voor de periode “*december 2002 – maart 2013*”. Voor NO₂ is er een duidelijk stijgende tendens waarneembaar, vooral in het meetpunt LEB2 en in een iets mindere mate in het meetpunt LEC1. Voor CO stagneert de concentratie en lijkt er voorlopig een einde te komen aan de dalende tendens.

In figuur 11 wordt de evolutie weergegeven van de verhouding “**NO₂/NO_x**” in de tunnel, Er wordt een toename vastgesteld van ca. 0,12 eind 2002 naar ca. 0,17 of 0,19 eind 2012.

De massaconcentratie van NO_x wordt uitgedrukt in equivalenten NO₂:

$$\text{NO}_x [\mu\text{g}/\text{m}^3] = 1,53 \text{ NO} [\mu\text{g}/\text{m}^3] + \text{NO}_2 [\mu\text{g}/\text{m}^3]$$

Tabel IV.a
CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING – HALFUURSWAARDEN

KALENDERJAAR
ALLE DAGEN – ALLE HALFUURSWAARDEN van de dag
 Percentielen NO in $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Post	Jaar	Pol	P ₃₀	P ₅₀	P ₇₀	P ₈₀	P ₉₀	P ₉₅	P ₉₈	P _{99,9}	AM	GM	%Np
41LEC1	2003	NO	840	1111	1325	1441	1624	1828	2431	4395	1092	902	93,6
41LEC1	2004	NO	793	1037	1230	1340	1518	1846	2414	4664	1026	820	93,4
41LEC1	2005	NO	701	922	1109	1208	1366	1628	2204	4254	927	767	92,7
41LEC1	2006	NO	704	946	1114	1211	1383	1812	2373	4988	939	732	89,8
41LEC1	2007	NO	640	866	1018	1111	1311	1790	2288	4107	874	703	93,7
41LEC1	2008	NO	592	785	954	1057	1240	1745	2231	4186	815	625	96,0
41LEC1	2009	NO	579	782	951	1072	1300	1712	2118	4863	815	627	88,7
41LEC1	2010	NO	863	1214	1475	1632	1929	2219	2677	5909	1179	847	92,0
41LEC1	2011	NO	654	892	1123	1312	1840	2424	3196	7196	1014	727	90,9
41LEC1	2012	NO	639	866	1042	1156	1445	2316	3106	6404	938	689	96,4
<hr/>													
41LEB2	2003	NO	1274	1711	2063	2238	2445	2636	2912	3830	1631	1420	96,6
41LEB2	2004	NO	1126	1520	1835	1991	2195	2367	2617	3680	1447	1220	97,1
41LEB2	2005	NO	1051	1420	1713	1882	2134	2358	2578	3477	1377	1187	96,9
41LEB2	2006	NO	996	1350	1664	1841	2087	2265	2481	3449	1322	1124	94,8
41LEB2	2007	NO	1026	1382	1676	1840	2074	2279	2506	3574	1339	1139	93,8
41LEB2	2008	NO	899	1233	1520	1669	1881	2060	2278	3117	1189	979	94,4
41LEB2	2009	NO	863	1182	1465	1635	1856	2033	2300	3561	1166	984	92,1
41LEB2	2010	NO	1018	1560	1957	2153	2406	2641	2931	4062	1486	1160	96,8
41LEB2	2011	NO	802	1360	1744	1972	2318	2653	3037	4619	1330	960	90,8
41LEB2	2012	NO	1029	1443	1797	2023	2360	2699	3091	4296	1437	1163	94,1

Tabel IV.b
CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING – HALFUURSWAARDEN

KALENDERJAAR
ALLE DAGEN – ALLE HALFUURSWAARDEN van de dag
 Percentielen NO₂ in µg/m³

Post	Jaar	Pol	P ₃₀	P ₅₀	P ₇₀	P ₈₀	P ₉₀	P ₉₅	P ₉₈	P _{99,9}	AM	GM	%Np
41LEC1	2003	NO ₂	204	271	325	355	408	506	673	1316	278	244	93,6
41LEC1	2004	NO ₂	203	268	321	351	415	543	734	1504	279	240	93,4
41LEC1	2005	NO ₂	204	269	328	363	420	539	734	1369	283	246	92,7
41LEC1	2006	NO ₂	245	329	390	423	493	654	903	1766	338	289	89,8
41LEC1	2007	NO ₂	243	338	407	449	540	740	963	1708	350	293	93,2
41LEC1	2008	NO ₂	268	356	429	469	547	816	1045	1961	376	322	96,0
41LEC1	2009	NO ₂	263	350	423	471	573	765	950	2059	371	316	88,7
41LEC1	2010	NO ₂	337	471	607	681	785	905	1084	2439	485	398	92,0
41LEC1	2011	NO ₂	272	367	453	523	698	912	1174	2831	409	335	90,8
41LEC1	2012	NO ₂	251	333	393	428	520	769	1013	1932	351	298	96,4
41LEB2	2003	NO ₂	264	360	449	498	567	634	727	985	363	323	96,6
41LEB2	2004	NO ₂	270	368	458	510	601	682	777	1124	375	330	97,1
41LEB2	2005	NO ₂	294	394	489	547	655	767	914	1401	409	360	96,9
41LEB2	2006	NO ₂	319	442	553	622	737	851	994	1470	455	396	94,8
41LEB2	2007	NO ₂	381	531	664	753	866	973	1122	1705	539	467	93,8
41LEB2	2008	NO ₂	350	500	635	715	826	925	1071	1622	506	432	94,2
41LEB2	2009	NO ₂	372	509	638	710	833	964	1183	2061	526	458	91,6
41LEB2	2010	NO ₂	425	621	785	883	1057	1212	1399	1991	630	533	96,8
41LEB2	2011	NO ₂	376	558	712	796	969	1195	1491	3109	582	480	90,8
41LEB2	2012	NO ₂	379	522	640	710	844	993	1209	1829	530	459	94,1

Tabel IV.c
CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING – HALFUURSWAARDEN

KALENDERJAAR
ALLE DAGEN – ALLE HALFUURSWAARDEN van de dag
 Percentielen NO_x in µg/m³

Post	Jaar	Pol	P ₃₀	P ₅₀	P ₇₀	P ₈₀	P ₉₀	P ₉₅	P ₉₈	P _{99,9}	AM	GM	%Np
41LEC1	2003	NO _x	1497	1975	2351	2555	2866	3279	4389	7940	1946	1643	93,6
41LEC1	2004	NO _x	1425	1863	2200	2389	2699	3344	4410	8560	1846	1518	93,4
41LEC1	2005	NO _x	1280	1680	2024	2203	2484	3008	4093	7846	1699	1436	92,7
41LEC1	2006	NO _x	1323	1783	2096	2259	2570	3428	4533	9373	1772	1437	89,8
41LEC1	2007	NO _x	1229	1667	1959	2137	2525	3498	4456	7888	1686	1394	93,2
41LEC1	2008	NO _x	1178	1560	1886	2080	2420	3500	4420	8273	1622	1311	96,0
41LEC1	2009	NO _x	1154	1552	1879	2102	2529	3402	4140	9715	1616	1304	88,7
41LEC1	2010	NO _x	1656	2337	2874	3185	3707	4223	5071	11608	2286	1740	92,0
41LEC1	2011	NO _x	1272	1738	2168	2513	3499	4632	6022	13701	1959	1480	90,8
41LEC1	2012	NO _x	1228	1668	1984	2184	2694	4309	5675	11503	1784	1383	96,4
41LEB2	2003	NO _x	2214	2985	3609	3912	4284	4612	5105	6695	2856	2505	96,6
41LEB2	2004	NO _x	1996	2698	3270	3556	3935	4271	4727	6598	2586	2215	97,1
41LEB2	2005	NO _x	1911	2568	3104	3415	3915	4347	4807	6412	2512	2188	96,9
41LEB2	2006	NO _x	1849	2516	3101	3432	3908	4283	4711	6368	2475	2131	94,8
41LEB2	2007	NO _x	1958	2652	3235	3569	4016	4425	4872	6817	2585	2224	94,3
41LEB2	2008	NO _x	1732	2387	2972	3266	3675	4032	4482	6092	2322	1948	94,4
41LEB2	2009	NO _x	1693	2319	2881	3212	3667	4038	4618	7067	2306	1975	91,6
41LEB2	2010	NO _x	1980	3013	3796	4192	4704	5162	5740	7879	2901	2349	96,8
41LEB2	2011	NO _x	1597	2638	3383	3815	4495	5239	6015	10186	2614	2002	90,8
41LEB2	2012	NO _x	1958	2736	3396	3807	4446	5085	5890	8282	2726	2263	94,1

Tabel IV.d
CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING – HALFUURSWAARDEN

KALENDERJAAR
ALLE DAGEN – ALLE HALFUURSWAARDEN van de dag
 Percentielen CO in mg/m³

Post	Jaar	Pol	P ₃₀	P ₅₀	P ₇₀	P ₈₀	P ₉₀	P ₉₅	P ₉₈	P _{99,9}	AM	GM	%Np
41LEC1	2003	CO	6.36	8.11	9.38	10.23	11.67	14.30	20.65	41.14	8.12	6.82	95,2
41LEC1	2004	CO	5.65	7.04	8.18	8.93	10.47	13.49	18.11	40.60	7.15	5.86	94,3
41LEC1	2005	CO	4.83	5.99	6.98	7.62	8.72	10.88	14.40	28.24	6.07	5.18	88,5
41LEC1	2006	CO	4.05	5.09	5.96	6.57	7.74	9.88	12.16	25.40	5.14	4.23	88,1
41LEC1	2007	CO	3.32	4.22	4.89	5.32	6.28	8.42	10.85	22.91	4.26	3.55	63,8
41LEC1	2008	CO	3.02	3.81	4.42	4.82	5.62	7.70	9.94	20.35	3.86	3.21	80,0
41LEC1	2009	CO	2.90	3.65	4.34	4.75	5.58	6.98	8.65	21.00	3.72	3.17	96,5
41LEC1	2010	CO	2.77	3.81	4.59	5.05	5.87	6.84	8.37	20.56	3.71	2.75	87,9
41LEC1	2011	CO	2.38	3.15	3.84	4.41	5.70	7.64	9.67	24.44	3.41	2.69	93,4
41LEC1	2012	CO	1.23	1.81	2.33	2.73	3.81	5.90	7.82	20.01	2.12	1.41	91,0
<hr/>													
41LEB2	2003	CO	6.60	8.53	10.19	11.34	13.05	14.68	16.99	24.51	8.46	7.39	96,3
41LEB2	2004	CO	5.84	7.46	8.78	9.76	11.51	12.94	14.80	22.09	7.34	6.26	95,2
41LEB2	2005	CO	5.38	6.65	7.81	8.72	10.51	12.16	13.98	19.49	6.71	5.87	96,5
41LEB2	2006	CO	4.58	5.75	6.83	7.61	8.94	10.08	11.43	15.17	5.75	5.02	93,9
41LEB2	2007	CO	4.14	5.17	6.07	6.72	7.70	8.53	9.60	14.22	5.06	4.41	96,5
41LEB2	2008	CO	3.27	4.32	5.20	5.69	6.50	7.26	8.30	11.78	4.19	3.56	93,8
41LEB2	2009	CO	2.87	3.73	4.48	5.02	5.79	6.52	7.53	12.27	3.71	3.20	95,5
41LEB2	2010	CO	3.14	4.32	5.21	5.73	6.50	7.20	8.17	11.60	4.18	3.57	96,2
41LEB2	2011	CO	2.47	3.60	4.45	5.02	5.95	7.02	8.31	12.24	3.59	2.88	94,2
41LEB2	2012	CO	2.80	3.59	4.25	4.70	5.56	6.39	7.41	10.22	3.58	3.13	97,0

Tabel V.a
CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING – UURWAARDEN

KALENDERJAAR
ALLE DAGEN – ALLE UURWAARDEN van de dag
 Percentielen NO in $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Post	Jaar	Pol	P ₃₀	P ₅₀	P ₇₀	P ₈₀	P ₉₀	P ₉₅	P ₉₈	P _{99,9}	AM	GM	%Np
41LEC1	2003	NO	840	1116	1330	1441	1620	1826	2405	4081	1092	911	93,4
41LEC1	2004	NO	794	1043	1234	1343	1520	1827	2366	4305	1026	832	93,2
41LEC1	2005	NO	697	924	1115	1208	1364	1654	2155	3974	927	778	92,7
41LEC1	2006	NO	701	948	1117	1212	1395	1787	2332	4721	938	743	89,6
41LEC1	2007	NO	641	870	1022	1112	1320	1765	2247	3714	874	712	93,5
41LEC1	2008	NO	592	789	961	1065	1240	1732	2194	4028	815	635	95,8
41LEC1	2009	NO	581	786	957	1071	1304	1696	2102	4356	815	637	88,5
41LEC1	2010	NO	863	1221	1473	1634	1913	2213	2667	5962	1179	863	91,8
41LEC1	2011	NO	650	894	1125	1324	1851	2405	3214	6979	1014	737	90,7
41LEC1	2012	NO	633	872	1047	1161	1458	2260	3072	6118	938	700	96,3
41LEB2	2003	NO	1278	1720	2066	2235	2433	2627	2873	3611	1631	1428	96,4
41LEB2	2004	NO	1130	1523	1839	1989	2196	2362	2575	3362	1447	1230	97,0
41LEB2	2005	NO	1068	1422	1716	1873	2133	2346	2556	3224	1377	1195	96,9
41LEB2	2006	NO	1004	1356	1672	1839	2072	2247	2455	3351	1322	1133	94,7
41LEB2	2007	NO	1031	1384	1681	1838	2065	2254	2465	3479	1339	1149	93,8
41LEB2	2008	NO	903	1233	1519	1670	1873	2039	2246	2914	1189	988	94,2
41LEB2	2009	NO	864	1184	1468	1634	1846	2028	2262	3312	1165	991	92,0
41LEB2	2010	NO	1024	1558	1961	2157	2397	2610	2899	3859	1486	1174	96,7
41LEB2	2011	NO	795	1356	1747	1971	2316	2632	3008	4533	1330	973	90,7
41LEB2	2012	NO	1034	1443	1805	2017	2360	2679	3041	4178	1436	1174	94,0

Tabel V.b
CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING – UURWAARDEN

KALENDERJAAR
ALLE DAGEN – ALLE UURWAARDEN van de dag
 Percentielen NO₂ in µg/m³

Post	Jaar	Pol	P ₃₀	P ₅₀	P ₇₀	P ₈₀	P ₉₀	P ₉₅	P ₉₈	P _{99,9}	AM	GM	%Np
41LEC1	2003	NO ₂	204	273	328	356	406	509	653	1230	278	245	93,4
41LEC1	2004	NO ₂	202	270	323	353	417	533	721	1340	279	241	93,2
41LEC1	2005	NO ₂	203	271	328	366	424	534	716	1326	283	248	92,7
41LEC1	2006	NO ₂	244	332	391	425	497	655	888	1658	338	291	89,6
41LEC1	2007	NO ₂	243	338	408	451	550	740	945	1614	350	295	92,8
41LEC1	2008	NO ₂	268	358	431	470	552	802	1031	1853	376	323	95,8
41LEC1	2009	NO ₂	262	351	425	474	577	755	924	1887	371	318	88,5
41LEC1	2010	NO ₂	337	474	609	681	783	892	1076	2421	485	400	91,8
41LEC1	2011	NO ₂	271	368	455	526	708	891	1155	2745	409	337	90,6
41LEC1	2012	NO ₂	251	335	395	426	530	761	988	1819	351	299	96,3
41LEB2	2003	NO ₂	265	362	449	498	566	631	714	951	363	324	96,4
41LEB2	2004	NO ₂	271	368	458	510	602	680	769	1072	375	331	97,0
41LEB2	2005	NO ₂	294	395	489	549	656	767	894	1391	409	361	96,9
41LEB2	2006	NO ₂	319	444	554	623	734	848	978	1471	455	398	94,7
41LEB2	2007	NO ₂	384	533	665	754	866	974	1093	1672	539	469	93,8
41LEB2	2008	NO ₂	355	500	636	717	823	920	1053	1578	506	434	94,1
41LEB2	2009	NO ₂	375	512	639	712	836	968	1161	2005	526	459	91,4
41LEB2	2010	NO ₂	427	622	787	885	1057	1205	1384	1980	631	535	96,7
41LEB2	2011	NO ₂	376	557	713	796	970	1188	1454	2987	582	483	90,7
41LEB2	2012	NO ₂	379	522	641	710	844	989	1188	1795	530	460	94,0

Tabel V.c
CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING – UURWAARDEN

KALENDERJAAR
ALLE DAGEN – ALLE UURWAARDEN van de dag
 Percentielen NO_x in µg/m³

Post	Jaar	Pol	P ₃₀	P ₅₀	P ₇₀	P ₈₀	P ₉₀	P ₉₅	P ₉₈	P _{99,9}	AM	GM	%Np
41LEC1	2003	NO _x	1498	1984	2360	2553	2858	3274	4317	7447	1946	1656	93,4
41LEC1	2004	NO _x	1422	1872	2211	2393	2701	3325	4338	8053	1846	1535	93,2
41LEC1	2005	NO _x	1273	1690	2039	2199	2486	3054	4001	7402	1699	1450	92,7
41LEC1	2006	NO _x	1320	1793	2102	2266	2581	3397	4409	8819	1771	1453	89,6
41LEC1	2007	NO _x	1230	1678	1966	2141	2546	3435	4338	7394	1687	1406	92,8
41LEC1	2008	NO _x	1179	1569	1894	2087	2417	3441	4332	7729	1622	1323	95,8
41LEC1	2009	NO _x	1158	1562	1893	2105	2552	3338	4114	8436	1615	1316	88,5
41LEC1	2010	NO _x	1669	2342	2873	3189	3691	4224	5053	11232	2286	1761	91,8
41LEC1	2011	NO _x	1267	1745	2174	2533	3523	4555	5979	13408	1958	1493	90,6
41LEC1	2012	NO _x	1220	1675	1997	2195	2741	4205	5584	11141	1784	1398	96,3
<hr/>													
41LEB2	2003	NO _x	2221	3000	3611	3906	4271	4609	5040	6395	2855	2516	96,4
41LEB2	2004	NO _x	2003	2706	3268	3552	3932	4253	4686	6086	2586	2229	97,0
41LEB2	2005	NO _x	1926	2572	3111	3411	3907	4350	4782	5984	2513	2199	96,9
41LEB2	2006	NO _x	1865	2519	3111	3424	3897	4250	4650	6066	2474	2144	94,7
41LEB2	2007	NO _x	1965	2652	3248	3564	4012	4391	4759	6548	2584	2238	94,2
41LEB2	2008	NO _x	1746	2385	2972	3273	3670	3988	4382	5773	2321	1960	94,3
41LEB2	2009	NO _x	1700	2329	2888	3210	3642	4012	4542	6658	2305	1985	91,4
41LEB2	2010	NO _x	1989	3012	3798	4184	4685	5110	5694	7514	2901	2366	96,7
41LEB2	2011	NO _x	1588	2631	3391	3821	4500	5191	5961	9863	2614	2018	90,7
41LEB2	2012	NO _x	1958	2739	3407	3803	4441	5033	5768	7883	2724	2276	94,0

Tabel V.d
CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING – UURWAARDEN

KALENDERJAAR
ALLE DAGEN – ALLE UURWAARDEN van de dag
 Percentielen CO in mg/m³

Post	Jaar	Pol	P ₃₀	P ₅₀	P ₇₀	P ₈₀	P ₉₀	P ₉₅	P ₉₈	P _{99,9}	AM	GM	%Np
41LEC1	2003	CO	6,50	8,19	9,41	10,21	11,61	14,50	20,39	37,16	8,18	6,96	93,8
41LEC1	2004	CO	5,91	7,14	8,21	8,93	10,46	13,64	17,91	37,17	7,21	6,02	92,4
41LEC1	2005	CO	5,01	6,07	7,01	7,60	8,71	10,87	14,52	25,09	6,12	5,30	86,6
41LEC1	2006	CO	4,12	5,14	5,97	6,53	7,71	9,93	11,92	22,40	5,17	4,32	87,2
41LEC1	2007	CO	3,48	4,28	4,88	5,29	6,24	8,59	10,54	21,69	4,30	3,65	62,5
41LEC1	2008	CO	3,09	3,85	4,41	4,76	5,51	7,78	9,59	18,40	3,86	3,24	79,8
41LEC1	2009	CO	2,95	3,67	4,33	4,72	5,52	6,96	8,30	19,70	3,73	3,21	96,4
41LEC1	2010	CO	2,81	3,84	4,59	5,03	5,82	6,72	8,23	18,05	3,72	2,80	87,7
41LEC1	2011	CO	2,42	3,19	3,83	4,34	5,69	7,48	9,56	20,28	3,41	2,73	93,2
41LEC1	2012	CO	1,27	1,83	2,34	2,69	3,82	5,79	7,68	17,82	2,12	1,45	90,9
<hr/>													
41LEB2	2003	CO	6,76	8,67	10,28	11,34	13,00	14,51	16,57	23,08	8,53	7,54	94,8
41LEB2	2004	CO	5,99	7,55	8,85	9,81	11,52	12,82	14,43	20,99	7,42	6,43	93,4
41LEB2	2005	CO	5,47	6,75	7,85	8,74	10,52	12,10	13,80	18,07	6,78	6,01	94,9
41LEB2	2006	CO	4,70	5,82	6,90	7,65	8,89	10,03	11,28	14,67	5,82	5,16	91,9
41LEB2	2007	CO	4,26	5,22	6,10	6,71	7,66	8,35	9,38	13,33	5,11	4,51	95,1
41LEB2	2008	CO	3,32	4,35	5,19	5,68	6,40	7,15	8,15	10,81	4,19	3,59	93,6
41LEB2	2009	CO	2,89	3,75	4,49	4,98	5,75	6,47	7,38	11,39	3,71	3,24	95,4
41LEB2	2010	CO	3,14	4,36	5,21	5,71	6,42	7,11	8,03	10,69	4,18	3,60	96,1
41LEB2	2011	CO	2,47	3,63	4,44	4,98	5,87	6,91	8,16	11,90	3,59	2,91	94,1
41LEB2	2012	CO	2,81	3,62	4,25	4,68	5,47	6,35	7,26	9,98	3,58	3,15	96,9

Tabel VI.a
CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING – HALFUURSWAARDEN

KALENDERJAAR
ALLE WERKDAGEN – ALLE HALFUURSWAARDEN van de dag
 Percentielen NO in µg/m³

Post	Jaar	Pol	P ₃₀	P ₅₀	P ₇₀	P ₈₀	P ₉₀	P ₉₅	P ₉₈	P _{99,9}	AM	GM	%Np
41LEC1	2003	NO	901	1170	1387	1500	1690	1974	2688	4707	1138	899	93,7
41LEC1	2004	NO	845	1096	1295	1412	1616	2057	2590	4794	1072	809	92,9
41LEC1	2005	NO	752	988	1168	1274	1448	1890	2427	4783	980	778	92,8
41LEC1	2006	NO	762	1014	1174	1282	1545	2044	2608	5624	998	727	89,1
41LEC1	2007	NO	687	922	1070	1180	1488	1975	2448	4225	924	706	93,3
41LEC1	2008	NO	634	833	1012	1129	1393	1931	2375	4211	861	616	96,1
41LEC1	2009	NO	617	834	1020	1151	1475	1872	2305	5297	866	626	88,8
41LEC1	2010	NO	938	1284	1548	1722	2049	2346	2827	6739	1228	815	91,0
41LEC1	2011	NO	694	953	1208	1475	2099	2724	3453	7690	1092	722	89,4
41LEC1	2012	NO	675	913	1098	1248	1828	2591	3366	6643	1005	681	96,1
<hr/>													
41LEB2	2003	NO	1398	1827	2166	2318	2524	2732	3033	3926	1698	1443	96,0
41LEB2	2004	NO	1234	1637	1927	2073	2269	2447	2706	3878	1508	1229	96,8
41LEB2	2005	NO	1170	1531	1823	1993	2247	2434	2656	3593	1452	1223	97,0
41LEB2	2006	NO	1084	1466	1787	1959	2174	2346	2565	3688	1392	1144	94,9
41LEB2	2007	NO	1126	1486	1774	1928	2163	2350	2580	3721	1401	1154	93,0
41LEB2	2008	NO	981	1320	1597	1739	1949	2123	2342	3191	1237	985	94,5
41LEB2	2009	NO	950	1273	1570	1726	1931	2112	2416	3694	1224	998	91,5
41LEB2	2010	NO	1109	1667	2054	2241	2485	2714	2999	4176	1540	1147	96,5
41LEB2	2011	NO	790	1456	1873	2107	2475	2769	3138	4188	1382	926	89,2
41LEB2	2012	NO	1116	1543	1925	2157	2507	2831	3230	4441	1505	1169	93,7

Tabel VI.b
CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING – HALFUURSWAARDEN

KALENDERJAAR
ALLE WERKDAGEN – ALLE HALFUURSWAARDEN van de dag
 Percentielen NO₂ in µg/m³

Post	Jaar	Pol	P ₃₀	P ₅₀	P ₇₀	P ₈₀	P ₉₀	P ₉₅	P ₉₈	P _{99,9}	AM	GM	%Np
41LEC1	2003	NO ₂	223	297	346	376	446	560	749	1359	297	255	93,7
41LEC1	2004	NO ₂	218	295	343	377	462	606	788	1580	298	250	92,9
41LEC1	2005	NO ₂	221	294	354	390	468	624	791	1511	305	259	92,8
41LEC1	2006	NO ₂	269	362	415	452	569	760	1008	1842	365	302	89,1
41LEC1	2007	NO ₂	261	366	437	481	616	832	1029	1744	375	306	92,9
41LEC1	2008	NO ₂	287	390	459	500	636	913	1105	1999	403	333	96,1
41LEC1	2009	NO ₂	282	382	459	511	654	826	1008	2309	398	329	88,8
41LEC1	2010	NO ₂	367	517	655	723	834	945	1135	2708	513	406	91,0
41LEC1	2011	NO ₂	289	398	492	582	800	986	1278	2848	440	347	89,3
41LEC1	2012	NO ₂	264	356	414	456	632	849	1095	2010	373	305	96,1
41LEB2	2003	NO ₂	297	402	489	536	603	670	762	1034	391	343	96,0
41LEB2	2004	NO ₂	302	414	500	554	643	722	825	1155	404	349	96,8
41LEB2	2005	NO ₂	328	440	535	599	715	829	970	1427	443	384	97,0
41LEB2	2006	NO ₂	356	490	606	677	798	914	1044	1514	490	419	94,9
41LEB2	2007	NO ₂	423	590	737	809	922	1036	1196	1789	577	489	93,0
41LEB2	2008	NO ₂	390	554	692	766	869	975	1127	1684	541	454	94,3
41LEB2	2009	NO ₂	409	560	688	767	895	1045	1277	2223	561	476	90,9
41LEB2	2010	NO ₂	457	674	841	947	1137	1270	1461	2054	666	546	96,5
41LEB2	2011	NO ₂	388	599	764	856	1081	1289	1556	2339	613	487	89,2
41LEB2	2012	NO ₂	410	562	683	760	920	1071	1325	1841	561	473	93,7

Vervolg Tabel VI.c
CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING – HALFUURSWAARDEN

KALENDERJAAR
ALLE WERKDAGEN – ALLE HALFUURSWAARDEN van de dag
 Percentielen NO_x in µg/m³

Post	Jaar	Pol	P ₃₀	P ₅₀	P ₇₀	P ₈₀	P ₉₀	P ₉₅	P ₉₈	P _{99,9}	AM	GM	%Np
41LEC1	2003	NO _x	1612	2096	2463	2658	3007	3579	4845	8538	2036	1656	93,7
41LEC1	2004	NO _x	1525	1982	2323	2519	2880	3749	4749	8765	1936	1519	92,9
41LEC1	2005	NO _x	1378	1813	2139	2330	2662	3522	4461	8941	1803	1471	92,8
41LEC1	2006	NO _x	1442	1928	2210	2388	2880	3894	4984	10466	1890	1453	89,1
41LEC1	2007	NO _x	1319	1787	2068	2272	2878	3801	4719	7989	1788	1419	92,9
41LEC1	2008	NO _x	1265	1672	2002	2217	2744	3853	4661	8419	1720	1319	96,1
41LEC1	2009	NO _x	1233	1667	2024	2264	2871	3683	4483	9775	1722	1322	88,8
41LEC1	2010	NO _x	1810	2487	3032	3365	3926	4479	5311	13037	2390	1711	91,0
41LEC1	2011	NO _x	1356	1865	2335	2832	4011	5165	6565	14430	2109	1495	89,3
41LEC1	2012	NO _x	1301	1759	2088	2346	3432	4813	6169	12086	1908	1388	96,1
41LEB2	2003	NO _x	2441	3213	3804	4074	4432	4811	5362	6901	2986	2562	96,0
41LEB2	2004	NO _x	2194	2925	3453	3722	4088	4424	4908	6678	2708	2252	96,8
41LEB2	2005	NO _x	2127	2789	3325	3653	4146	4525	4981	6535	2662	2270	97,0
41LEB2	2006	NO _x	2024	2745	3339	3657	4092	4447	4909	6884	2617	2189	94,9
41LEB2	2007	NO _x	2148	2868	3459	3765	4202	4577	5041	7165	2717	2274	93,6
41LEB2	2008	NO _x	1894	2588	3141	3419	3818	4162	4621	6140	2429	1980	94,5
41LEB2	2009	NO _x	1865	2516	3107	3405	3834	4210	4901	7187	2430	2019	90,9
41LEB2	2010	NO _x	2168	3247	4004	4396	4887	5314	5927	8115	3019	2353	96,5
41LEB2	2011	NO _x	1573	2835	3645	4095	4842	5502	6216	8573	2725	1968	89,2
41LEB2	2012	NO _x	2126	2928	3637	4058	4723	5381	6178	8408	2860	2291	93,7

Tabel VI.d
CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING – HALFUURSWAARDEN

KALENDERJAAR
ALLE WERKDAGEN – ALLE HALFUURSWAARDEN van de dag
 Percentielen CO in mg/m³

Post	Jaar	Pol	P ₃₀	P ₅₀	P ₇₀	P ₈₀	P ₉₀	P ₉₅	P ₉₈	P _{99,9}	AM	GM	%Np
41LEC1	2003	CO	6.54	8.18	9.42	10.33	12.38	15.95	22.83	43.16	8.28	6.69	95,2
41LEC1	2004	CO	5.82	7.16	8.37	9.23	11.37	14.86	19.21	42.83	7.32	5.73	93,8
41LEC1	2005	CO	4.99	6.10	7.14	7.84	9.36	12.32	16.28	29.80	6.26	5.17	98,4
41LEC1	2006	CO	4.15	5.21	6.10	6.78	8.66	10.84	13.13	27.56	5.30	4.15	87,6
41LEC1	2007	CO	3.43	4.26	4.96	5.47	6.97	9.26	11.42	23.17	4.38	3.54	65,5
41LEC1	2008	CO	3.11	3.88	4.51	4.98	6.39	8.47	10.46	21.60	3.97	3.16	79,8
41LEC1	2009	CO	2.97	3.77	4.47	4.96	6.15	7.59	9.14	20.77	3.85	3.17	96,2
41LEC1	2010	CO	2.80	3.90	4.67	5.16	6.09	7.19	8.78	21.81	3.76	2.62	88,0
41LEC1	2011	CO	2.45	3.28	4.06	4.76	6.48	8.38	10.29	25.55	3.60	2.71	92,8
41LEC1	2012	CO	1.26	1.88	2.46	2.97	4.79	6.61	8.46	20.11	2.28	1.43	90,6
<hr/>													
41LEB2	2003	CO	6.85	8.72	10.49	11.73	13.61	15.33	17.82	25.14	8.62	7.34	96,0
41LEB2	2004	CO	6.13	7.64	9.12	10.38	12.07	13.43	15.49	22.25	7.50	6.17	94,7
41LEB2	2005	CO	5.61	6.81	8.08	9.33	11.32	12.81	14.56	19.95	6.92	5.90	96,4
41LEB2	2006	CO	4.77	5.94	7.12	8.08	9.43	10.56	11.90	15.36	5.91	5.00	94,0
41LEB2	2007	CO	4.29	5.27	6.23	6.98	7.97	8.78	9.85	14.22	5.13	4.33	96,2
41LEB2	2008	CO	3.41	4.45	5.32	5.82	6.66	7.49	8.55	11.78	4.24	3.51	94,5
41LEB2	2009	CO	3.02	3.87	4.69	5.25	6.07	6.83	7.86	12.22	3.82	3.20	95,1
41LEB2	2010	CO	3.20	4.44	5.35	5.89	6.66	7.37	8.42	11.69	4.23	3.52	96,2
41LEB2	2011	CO	2.45	3.75	4.66	5.27	6.32	7.45	8.60	12.02	3.68	2.81	93,1
41LEB2	2012	CO	2.91	3.73	4.45	5.01	5.96	6.80	7.78	10.45	3.70	3.14	96,8

Tabel VII.a
CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING – UURWAARDEN

KALENDERJAAR
ALLE WERKDAGEN – ALLE UURWAARDEN van de dag
 Percentielen NO in $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Post	Jaar	Pol	P ₃₀	P ₅₀	P ₇₀	P ₈₀	P ₉₀	P ₉₅	P ₉₈	P _{99,9}	AM	GM	%Np
41LEC1	2003	NO	903	1181	1392	1496	1685	1962	2621	4118	1138	912	93,4
41LEC1	2004	NO	851	1110	1298	1414	1617	2031	2496	4364	1071	826	92,7
41LEC1	2005	NO	755	994	1173	1275	1466	1827	2372	4284	981	791	92,7
41LEC1	2006	NO	761	1024	1176	1285	1585	1998	2478	5196	998	743	88,9
41LEC1	2007	NO	690	929	1075	1179	1513	1934	2401	3743	924	718	93,1
41LEC1	2008	NO	635	839	1016	1128	1424	1908	2319	4031	862	629	95,9
41LEC1	2009	NO	621	842	1021	1153	1472	1847	2244	4527	866	638	88,6
41LEC1	2010	NO	943	1292	1545	1720	2024	2337	2773	6110	1228	835	90,8
41LEC1	2011	NO	689	961	1211	1507	2084	2653	3515	7415	1091	736	89,1
41LEC1	2012	NO	670	921	1107	1255	1852	2561	3393	6449	1005	696	95,9
<hr/>													
41LEB2	2003	NO	1391	1840	2167	2314	2518	2695	2962	3659	1697	1453	95,8
41LEB2	2004	NO	1218	1651	1929	2070	2254	2426	2654	3533	1508	1242	96,6
41LEB2	2005	NO	1162	1536	1824	1987	2237	2420	2620	3239	1452	1234	97,0
41LEB2	2006	NO	1089	1474	1791	1953	2160	2318	2538	3398	1392	1156	94,7
41LEB2	2007	NO	1129	1493	1779	1926	2155	2325	2525	3517	1401	1168	92,9
41LEB2	2008	NO	986	1325	1605	1735	1934	2093	2305	2914	1236	996	94,3
41LEB2	2009	NO	951	1279	1575	1720	1925	2102	2332	3319	1223	1008	91,4
41LEB2	2010	NO	1113	1688	2058	2235	2473	2695	2967	3898	1540	1165	96,4
41LEB2	2011	NO	769	1457	1879	2109	2461	2752	3113	4096	1382	943	89,1
41LEB2	2012	NO	1121	1544	1926	2156	2495	2773	3173	4220	1504	1183	93,5

Tabel VII.b
CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING – UURWAARDEN

KALENDERJAAR
ALLE WERKDAGEN – ALLE UURWAARDEN van de dag
 Percentielen NO₂ in µg/m³

Post	Jaar	Pol	P ₃₀	P ₅₀	P ₇₀	P ₈₀	P ₉₀	P ₉₅	P ₉₈	P _{99,9}	AM	GM	%Np
41LEC1	2003	NO ₂	223	299	348	378	444	559	726	1282	297	257	93,4
41LEC1	2004	NO ₂	217	298	345	378	464	588	763	1402	298	252	92,7
41LEC1	2005	NO ₂	221	297	358	393	471	609	768	1349	305	261	92,7
41LEC1	2006	NO ₂	268	364	417	454	566	749	964	1744	365	304	88,9
41LEC1	2007	NO ₂	260	368	439	483	618	808	1010	1652	375	308	92,5
41LEC1	2008	NO ₂	289	394	459	502	652	889	1087	1882	404	336	95,9
41LEC1	2009	NO ₂	281	385	462	515	651	820	982	2040	398	331	88,6
41LEC1	2010	NO ₂	370	522	658	723	826	943	1138	2634	513	409	90,8
41LEC1	2011	NO ₂	288	400	495	590	797	969	1284	2756	440	349	89,0
41LEC1	2012	NO ₂	263	360	415	456	634	830	1083	1819	373	307	95,9
<hr/>													
41LEB2	2003	NO ₂	297	406	490	535	600	669	748	991	391	344	95,8
41LEB2	2004	NO ₂	299	417	500	554	640	717	803	1127	404	351	96,6
41LEB2	2005	NO ₂	325	445	537	599	713	822	952	1515	444	385	96,9
41LEB2	2006	NO ₂	356	494	606	677	793	907	1024	1492	490	421	94,7
41LEB2	2007	NO ₂	421	596	734	809	922	1021	1152	1685	577	491	92,9
41LEB2	2008	NO ₂	396	554	694	765	869	960	1107	1595	541	455	94,1
41LEB2	2009	NO ₂	410	563	689	763	899	1037	1241	2025	561	478	90,7
41LEB2	2010	NO ₂	457	674	843	950	1131	1268	1439	1995	666	548	96,4
41LEB2	2011	NO ₂	386	602	763	862	1082	1283	1547	2303	613	489	89,1
41LEB2	2012	NO ₂	411	561	684	762	914	1058	1318	1800	560	474	93,5

Tabel VII.c
CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING – UURWAARDEN

KALENDERJAAR
ALLE WERKDAGEN – ALLE UURWAARDEN van de dag
 Percentielen NO_x in µg/m³

Post	Jaar	Pol	P ₃₀	P ₅₀	P ₇₀	P ₈₀	P ₉₀	P ₉₅	P ₉₈	P _{99,9}	AM	GM	%Np
41LEC1	2003	NO _x	1611	2120	2472	2654	2986	3546	4723	7455	2035	1673	93,4
41LEC1	2004	NO _x	1537	2007	2335	2525	2884	3678	4566	8219	1935	1541	92,7
41LEC1	2005	NO _x	1378	1823	2147	2334	2682	3408	4387	7982	1803	1489	92,7
41LEC1	2006	NO _x	1439	1951	2210	2393	2967	3800	4740	9597	1889	1473	88,9
41LEC1	2007	NO _x	1330	1796	2073	2277	2911	3781	4632	7424	1789	1434	92,5
41LEC1	2008	NO _x	1264	1682	2012	2222	2839	3805	4637	8115	1720	1335	95,9
41LEC1	2009	NO _x	1237	1682	2026	2257	2879	3622	4402	8990	1721	1337	88,6
41LEC1	2010	NO _x	1822	2520	3039	3364	3915	4447	5216	11842	2390	1737	90,8
41LEC1	2011	NO _x	1344	1880	2341	2888	3980	5033	6569	13827	2108	1513	89,0
41LEC1	2012	NO _x	1290	1775	2103	2359	3474	4726	6215	11735	1907	1407	95,9
<hr/>													
41LEB2	2003	NO _x	2417	3232	3799	4067	4430	4753	5192	6454	2984	2576	95,8
41LEB2	2004	NO _x	2164	2950	3454	3718	4070	4376	4827	6263	2708	2271	96,6
41LEB2	2005	NO _x	2112	2801	3323	3643	4128	4524	4886	6147	2662	2285	97,0
41LEB2	2006	NO _x	2035	2774	3336	3650	4059	4414	4808	6558	2617	2206	94,7
41LEB2	2007	NO _x	2148	2877	3466	3757	4182	4535	4929	6636	2717	2292	93,5
41LEB2	2008	NO _x	1913	2587	3156	3413	3794	4121	4550	5773	2428	1996	94,3
41LEB2	2009	NO _x	1868	2532	3098	3402	3821	4174	4730	7214	2429	2033	90,7
41LEB2	2010	NO _x	2162	3268	4013	4385	4851	5278	5853	7840	3019	2374	96,4
41LEB2	2011	NO _x	1554	2826	3656	4095	4833	5449	6149	8532	2725	1988	89,1
41LEB2	2012	NO _x	2138	2936	3629	4054	4713	5297	6074	7926	2858	2308	93,5

Tabel VII.d
CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING – UURWAARDEN

KALENDERJAAR
ALLE WERKDAGEN – ALLE UURWAARDEN van de dag
 Percentielen CO in mg/m³

Post	Jaar	Pol	P ₃₀	P ₅₀	P ₇₀	P ₈₀	P ₉₀	P ₉₅	P ₉₈	P _{99,9}	AM	GM	%Np
41LEC1	2003	CO	6.74	8.25	9.45	10.34	12.51	16.09	22.79	38.76	8.35	6.86	93,7
41LEC1	2004	CO	6.08	7.26	8.39	9.24	11.48	14.81	18.87	35.93	7.40	5.93	91,9
41LEC1	2005	CO	5.19	6.18	7.15	7.80	9.48	12.32	15.87	26.26	6.33	5.31	87,4
41LEC1	2006	CO	4.24	5.26	6.11	6.75	8.70	10.81	12.75	24.08	5.33	4.25	86,6
41LEC1	2007	CO	3.59	4.33	4.95	5.47	6.98	9.07	11.09	21.69	4.42	3.65	64,2
41LEC1	2008	CO	3.21	3.93	4.49	4.88	6.54	8.36	10.22	19.94	3.98	3.20	79,6
41LEC1	2009	CO	3.05	3.81	4.46	4.91	6.17	7.54	8.77	18.32	3.85	3.21	96,1
41LEC1	2010	CO	2.87	3.93	4.65	5.10	6.09	7.09	8.64	19.11	3.76	2.67	87,7
41LEC1	2011	CO	2.49	3.31	4.03	4.71	6.59	8.25	10.22	22.86	3.60	2.75	92,6
41LEC1	2012	CO	1.32	1.92	2.46	2.92	4.80	6.44	8.34	18.11	2.28	1.48	90,4
<hr/>													
41LEB2	2003	CO	7.05	8.87	10.51	11.72	13.58	15.21	17.19	23.74	8.71	7.52	94,5
41LEB2	2004	CO	6.25	7.75	9.21	10.39	12.03	13.32	14.85	21.08	7.60	6.37	92,9
41LEB2	2005	CO	5.75	6.90	8.15	9.37	11.27	12.70	14.29	18.09	7.00	6.06	94,7
41LEB2	2006	CO	4.90	6.01	7.22	8.09	9.38	10.47	11.60	14.71	5.99	5.17	92,0
41LEB2	2007	CO	4.40	5.32	6.27	7.02	7.93	8.62	9.60	13.20	5.18	4.44	94,7
41LEB2	2008	CO	3.46	4.49	5.33	5.78	6.60	7.40	8.36	10.51	4.25	3.54	94,3
41LEB2	2009	CO	3.02	3.89	4.68	5.23	6.04	6.69	7.64	11.39	3.82	3.24	94,9
41LEB2	2010	CO	3.23	4.48	5.33	5.84	6.62	7.29	8.28	10.88	4.23	3.55	96,1
41LEB2	2011	CO	2.43	3.78	4.64	5.26	6.31	7.36	8.45	11.47	3.68	2.85	93,0
41LEB2	2012	CO	2.92	3.76	4.45	4.98	5.93	6.73	7.63	9.98	3.70	3.17	96,6

Tabel VIII.a
CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING – HALFUURSWAARDEN

KALENDERJAAR
ALLE NIET-WERKDAGEN – ALLE HALFUURSWAARDEN van de dag
 Percentielen NO in $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Post	Jaar	Pol	P ₃₀	P ₅₀	P ₇₀	P ₈₀	P ₉₀	P ₉₅	P ₉₈	P _{99,9}	AM	GM	%Np
41LEC1	2003	NO	754	1000	1185	1283	1423	1574	1752	3057	990	907	93,5
41LEC1	2004	NO	717	932	1085	1172	1292	1391	1566	4023	924	843	94,4
41LEC1	2005	NO	628	822	966	1058	1164	1243	1358	2033	808	745	92,6
41LEC1	2006	NO	625	826	979	1056	1169	1253	1354	2604	812	741	91,1
41LEC1	2007	NO	575	772	902	971	1071	1172	1376	3855	764	697	94,5
41LEC1	2008	NO	541	703	838	914	1026	1122	1247	3378	711	646	95,8
41LEC1	2009	NO	527	691	826	902	1020	1125	1338	3904	700	631	88,3
41LEC1	2010	NO	768	1076	1310	1446	1644	1824	2043	4185	1070	923	94,2
41LEC1	2011	NO	610	801	979	1097	1295	1581	1971	5234	852	737	94,2
41LEC1	2012	NO	594	788	935	1018	1127	1240	1424	4402	792	705	97,1
<hr/>													
41LEB2	2003	NO	1103	1511	1802	1977	2191	2351	2531	3002	1487	1371	97,8
41LEB2	2004	NO	969	1344	1582	1724	1920	2097	2294	2786	1311	1201	97,8
41LEB2	2005	NO	894	1240	1471	1599	1765	1895	2081	2841	1211	1110	96,7
41LEB2	2006	NO	867	1176	1410	1549	1728	1868	2055	2664	1169	1082	94,7
41LEB2	2007	NO	886	1218	1456	1592	1785	1935	2187	2904	1207	1107	95,7
41LEB2	2008	NO	780	1078	1327	1464	1658	1826	2028	2743	1083	967	94,2
41LEB2	2009	NO	739	1040	1248	1383	1568	1735	1948	3068	1039	954	93,5
41LEB2	2010	NO	916	1368	1724	1908	2138	2347	2628	3357	1363	1190	97,4
41LEB2	2011	NO	808	1188	1531	1694	1917	2156	2462	5005	1219	1035	94,3
41LEB2	2012	NO	921	1285	1559	1738	1961	2155	2527	3207	1289	1151	95,1

Tabel VIII.b
CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING – HALFUURSWAARDEN

KALENDERJAAR
ALLE NIET-WERKDAGEN – ALLE HALFUURSWAARDEN van de dag
 Percentielen NO₂ in µg/m³

Post	Jaar	Pol	P ₃₀	P ₅₀	P ₇₀	P ₈₀	P ₉₀	P ₉₅	P ₉₈	P _{99,9}	AM	GM	%Np
41LEC1	2003	NO ₂	183	235	278	299	329	353	389	859	235	221	93,5
41LEC1	2004	NO ₂	183	231	270	288	313	337	414	1252	235	219	94,4
41LEC1	2005	NO ₂	184	233	275	298	328	352	381	627	233	220	92,6
41LEC1	2006	NO ₂	219	281	333	358	390	421	461	1000	280	263	91,1
41LEC1	2007	NO ₂	226	295	349	379	417	455	569	1298	295	266	93,9
41LEC1	2008	NO ₂	248	307	363	395	429	460	513	1532	315	297	95,7
41LEC1	2009	NO ₂	241	303	358	386	423	457	553	1585	309	290	88,3
41LEC1	2010	NO ₂	307	401	507	560	636	707	836	1819	422	381	94,2
41LEC1	2011	NO ₂	256	321	384	421	499	588	737	1939	343	311	94,2
41LEC1	2012	NO ₂	238	300	353	377	408	439	522	1670	303	283	97,1
<hr/>													
41LEB2	2003	NO ₂	227	304	365	398	439	473	509	636	302	283	97,8
41LEB2	2004	NO ₂	234	310	370	401	441	473	528	726	309	290	97,8
41LEB2	2005	NO ₂	253	334	395	428	474	514	560	789	332	312	96,7
41LEB2	2006	NO ₂	282	370	453	499	562	609	686	1036	378	352	94,7
41LEB2	2007	NO ₂	341	548	547	595	660	718	815	1129	456	424	95,7
41LEB2	2008	NO ₂	310	417	514	568	642	707	799	1217	425	388	94,2
41LEB2	2009	NO ₂	334	442	532	582	650	711	800	1377	448	419	93,0
41LEB2	2010	NO ₂	394	535	668	739	833	919	1052	1428	550	504	97,7
41LEB2	2011	NO ₂	370	493	612	679	766	840	968	3547	519	468	94,3
41LEB2	2012	NO ₂	343	460	559	610	677	741	857	1122	465	431	95,1

Tabel VIII.c
CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING – HALFUURSWAARDEN

KALENDERJAAR
ALLE NIET-WERKDAGEN – ALLE HALFUURSWAARDEN van de dag
 Percentielen NO_x in µg/m³

Post	Jaar	Pol	P ₃₀	P ₅₀	P ₇₀	P ₈₀	P ₉₀	P ₉₅	P ₉₈	P _{99,9}	AM	GM	%Np
41LEC1	2003	NO _x	1338	1773	2088	2256	2485	2732	3018	5527	1748	1616	93,5
41LEC1	2004	NO _x	1281	1666	1929	2073	2270	2430	2757	7385	1646	1516	94,4
41LEC1	2005	NO _x	1145	1498	1754	1910	2097	2236	2431	3728	1468	1364	92,6
41LEC1	2006	NO _x	1175	1554	1832	1968	2158	2307	2493	5021	1521	1405	91,1
41LEC1	2007	NO _x	1109	1487	1730	1853	2043	2226	2606	6917	1465	1343	93,9
41LEC1	2008	NO _x	1077	1384	1643	1793	1987	2155	2398	6611	1403	1292	95,7
41LEC1	2009	NO _x	1046	1369	1618	1757	1965	2164	2558	7550	1379	1265	88,3
41LEC1	2010	NO _x	1486	2047	2510	2770	3149	3455	3889	8218	2058	1808	94,2
41LEC1	2011	NO _x	1189	1547	1878	2103	2458	3007	3736	9874	1645	1448	94,2
41LEC1	2012	NO _x	1142	1511	1784	1925	2123	2304	2614	8140	1514	1373	97,1
41LEB2	2003	NO _x	1911	2629	3132	3415	3772	4037	4329	5168	2574	2386	97,8
41LEB2	2004	NO _x	1710	2375	2786	3029	3369	3650	4012	4875	2312	2133	97,8
41LEB2	2005	NO _x	1610	2236	2640	2880	3160	3385	3713	5079	2183	2017	96,7
41LEB2	2006	NO _x	1604	2168	2615	2876	3166	3421	3798	5129	2165	2011	94,7
41LEB2	2007	NO _x	1692	2321	2772	3030	3376	3656	4121	5469	2300	2122	95,7
41LEB2	2008	NO _x	1515	2078	2526	2797	3178	3482	3848	5237	2080	1878	94,2
41LEB2	2009	NO _x	1466	2039	2445	2686	3036	3343	3740	6060	2036	1881	93,0
41LEB2	2010	NO _x	1808	2632	3305	3656	4099	4501	5011	6521	2632	2342	97,4
41LEB2	2011	NO _x	1604	2308	2963	3262	3692	4103	4696	11132	2383	2075	94,3
41LEB2	2012	NO _x	1747	2435	2947	3261	3661	4028	4716	6008	2434	2202	95,1

Tabel VIII.d
CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING – HALFUURSWAARDEN

KALENDERJAAR
ALLE NIET-WERKDAGEN – ALLE HALFUURSWAARDEN van de dag
 Percentielen CO in mg/m³

Post	Jaar	Pol	P ₃₀	P ₅₀	P ₇₀	P ₈₀	P ₉₀	P ₉₅	P ₉₈	P _{99,9}	AM	GM	%Np
41LEC1	2003	CO	5.99	7.95	9.26	10.04	11.00	11.88	13.04	32.08	7.76	7.11	95,2
41LEC1	2004	CO	5.31	6.83	7.86	8.47	9.31	10.20	12.10	37.50	6.77	6.16	95,5
41LEC1	2005	CO	4.49	5.77	6.67	7.21	7.95	8.53	9.25	14.57	5.62	5.21	86,5
41LEC1	2006	CO	3.91	4.87	5.70	6.17	6.89	7.48	8.21	16.80	4.82	4.41	89,2
41LEC1	2007	CO	3.12	4.11	4.76	5.09	5.56	5.99	6.83	21.98	3.99	3.60	60,1
41LEC1	2008	CO	2.88	3.65	4.24	4.57	5.01	5.41	5.88	19.04	3.62	3.32	80,3
41LEC1	2009	CO	2.78	3.43	4.03	4.41	4.84	5.26	5.89	21.39	3.45	3.17	97,2
41LEC1	2010	CO	2.72	3.59	4.41	4.85	5.47	6.06	6.92	18.74	3.61	3.08	87,6
41LEC1	2011	CO	2.31	2.90	3.51	3.87	4.52	5.15	6.09	14.81	3.00	2.64	94,5
41LEC1	2012	CO	1.15	1.67	2.12	2.37	2.84	3.40	4.22	16.61	1.75	1.37	91,9
<hr/>													
41LEB2	2003	CO	6.21	8.14	9.71	10.67	11.90	12.93	14.25	19.51	8.11	7.49	96,8
41LEB2	2004	CO	5.43	7.03	8.23	8.92	9.85	10.95	12.50	20.94	6.97	6.46	96,2
41LEB2	2005	CO	4.93	6.33	7.43	8.01	8.78	9.50	10.60	17.86	6.25	5.82	96,9
41LEB2	2006	CO	4.32	5.42	6.31	6.90	7.65	8.30	9.32	13.91	5.41	5.07	93,6
41LEB2	2007	CO	3.91	4.95	5.80	6.28	6.98	7.58	8.51	13.95	4.92	4.58	97,3
41LEB2	2008	CO	3.11	4.02	4.89	5.37	6.08	6.70	7.40	12.06	4.07	3.69	92,1
41LEB2	2009	CO	2.66	3.46	4.14	4.52	5.07	5.60	6.23	12.35	3.48	3.21	96,4
41LEB2	2010	CO	3.07	4.08	4.91	5.39	6.07	6.65	7.50	10.42	4.07	3.71	96,2
41LEB2	2011	CO	2.48	3.32	4.08	4.53	5.16	5.72	6.72	12.49	3.39	3.03	96,5
41LEB2	2012	CO	2.67	3.33	3.91	4.23	4.65	5.09	5.64	8.33	3.31	3.09	97,5

Tabel IX.a
CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING – UURWAARDEN

KALENDERJAAR
ALLE NIET-WERKDAGEN – ALLE UURWAARDEN van de dag
 Percentielen NO in $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Post	Jaar	Pol	P ₃₀	P ₅₀	P ₇₀	P ₈₀	P ₉₀	P ₉₅	P ₉₈	P _{99,9}	AM	GM	%Np
41LEC1	2003	NO	759	1003	1181	1282	1422	1563	1747	2759	990	910	93,5
41LEC1	2004	NO	712	930	1088	1172	1295	1392	1585	3726	924	847	94,4
41LEC1	2005	NO	627	821	967	1057	1164	1237	1360	1957	808	748	92,6
41LEC1	2006	NO	624	827	979	1058	1162	1255	1350	2156	812	744	91,1
41LEC1	2007	NO	578	772	905	967	1071	1177	1363	3048	764	701	94,5
41LEC1	2008	NO	540	701	841	916	1022	1124	1249	3050	712	648	95,7
41LEC1	2009	NO	528	693	826	902	1018	1133	1320	4149	701	633	88,3
41LEC1	2010	NO	763	1078	1312	1444	1646	1827	2050	3833	1071	928	94,2
41LEC1	2011	NO	609	800	976	1094	1294	1590	1929	4660	852	740	94,2
41LEC1	2012	NO	594	788	937	1017	1125	1237	1438	4362	793	709	97,1
<hr/>													
41LEB2	2003	NO	1098	1517	1804	1975	2189	2342	2502	2881	1487	1374	97,8
41LEB2	2004	NO	967	1343	1580	1727	1920	2089	2268	2648	1311	1204	97,8
41LEB2	2005	NO	894	1240	1467	1598	1768	1895	2061	2674	1211	1112	96,7
41LEB2	2006	NO	867	1176	1410	1549	1730	1856	2066	2522	1169	1085	94,7
41LEB2	2007	NO	890	1213	1461	1598	1771	1928	2195	2899	1207	1111	95,7
41LEB2	2008	NO	781	1080	1329	1463	1662	1826	2031	2727	1084	970	94,2
41LEB2	2009	NO	743	1041	1249	1387	1570	1721	1944	2859	1039	956	93,4
41LEB2	2010	NO	911	1371	1723	1905	2134	2351	2613	3245	1363	1194	97,4
41LEB2	2011	NO	803	1198	1531	1697	1920	2150	2444	4902	1220	1039	94,3
41LEB2	2012	NO	916	1286	1566	1735	1960	2153	2478	3141	1289	1154	95,1

Tabel IX.b
CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING – UURWAARDEN

KALENDERJAAR
ALLE NIET-WERKDAGEN – ALLE UURWAARDEN van de dag
 Percentielen NO₂ in µg/m³

Post	Jaar	Pol	P ₃₀	P ₅₀	P ₇₀	P ₈₀	P ₉₀	P ₉₅	P ₉₈	P _{99,9}	AM	GM	%Np
41LEC1	2003	NO ₂	184	236	278	300	326	356	391	729	235	221	93,5
41LEC1	2004	NO ₂	183	232	270	288	313	341	429	1121	235	220	94,4
41LEC1	2005	NO ₂	184	234	275	297	328	351	378	575	233	221	92,6
41LEC1	2006	NO ₂	220	281	334	359	390	419	466	854	281	264	91,1
41LEC1	2007	NO ₂	228	295	350	381	415	452	560	1216	295	267	93,6
41LEC1	2008	NO ₂	249	309	364	394	430	458	513	1415	316	297	95,6
41LEC1	2009	NO ₂	240	304	358	387	422	455	540	1488	309	291	88,3
41LEC1	2010	NO ₂	307	402	507	562	634	703	822	1704	422	382	94,2
41LEC1	2011	NO ₂	256	321	384	421	500	589	722	1827	344	312	94,2
41LEC1	2012	NO ₂	238	299	353	378	407	438	529	1503	303	283	97,1
<hr/>													
41LEB2	2003	NO ₂	227	305	366	397	439	471	504	585	302	283	97,8
41LEB2	2004	NO ₂	233	311	370	401	441	474	524	679	309	290	97,8
41LEB2	2005	NO ₂	254	335	395	430	473	514	561	759	333	313	96,7
41LEB2	2006	NO ₂	280	371	455	498	562	609	682	909	379	352	94,7
41LEB2	2007	NO ₂	342	458	548	595	655	715	803	1025	456	425	95,7
41LEB2	2008	NO ₂	311	418	513	567	643	709	796	1191	425	389	94,2
41LEB2	2009	NO ₂	334	442	531	580	652	711	788	1244	448	420	92,8
41LEB2	2010	NO ₂	395	535	669	739	831	918	1044	1345	550	505	97,4
41LEB2	2011	NO ₂	371	494	611	680	761	840	965	3556	519	469	94,3
41LEB2	2012	NO ₂	343	461	559	611	676	740	845	1080	465	432	95,1

Tabel IX.c
CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING – UURWAARDEN

KALENDERJAAR
ALLE NIET-WERKDAGEN – ALLE UURWAARDEN van de dag
 Percentielen NO_x in µg/m³


Post	Jaar	Pol	P ₃₀	P ₅₀	P ₇₀	P ₈₀	P ₉₀	P ₉₅	P ₉₈	P _{99,9}	AM	GM	%Np
41LEC1	2003	NO _x	1337	1774	2092	2255	2479	2714	3035	4896	1749	1620	93,5
41LEC1	2004	NO _x	1278	1669	1932	2069	2281	2443	2871	6664	1647	1521	94,4
41LEC1	2005	NO _x	1144	1497	1750	1904	2090	2215	2426	3500	1469	1368	92,6
41LEC1	2006	NO _x	1177	1555	1834	1960	2151	2303	2491	4224	1522	1409	91,1
41LEC1	2007	NO _x	1114	1484	1734	1848	2046	2241	2602	5873	1465	1348	93,6
41LEC1	2008	NO _x	1081	1391	1648	1791	1986	2159	2399	6216	1404	1296	95,6
41LEC1	2009	NO _x	1046	1372	1622	1761	1954	2174	2536	7828	1380	1268	88,3
41LEC1	2010	NO _x	1479	2059	2516	2765	3152	3463	3901	7637	2058	1815	94,2
41LEC1	2011	NO _x	1185	1542	1875	2096	2458	3016	3636	9049	1646	1453	94,2
41LEC1	2012	NO _x	1148	1506	1783	1927	2113	2296	2677	8528	1514	1378	97,1
41LEB2	2003	NO _x	1916	2637	3122	3413	3770	4020	4295	4954	2574	2389	97,8
41LEB2	2004	NO _x	1717	2366	2787	3038	3367	3632	3976	4689	2312	2137	97,8
41LEB2	2005	NO _x	1616	2236	2644	2871	3146	3388	3688	4799	2183	2021	96,7
41LEB2	2006	NO _x	1597	2168	2615	2877	3174	3408	3780	4716	2165	2014	94,7
41LEB2	2007	NO _x	1692	2317	2776	3038	3367	3641	4145	5413	2300	2126	95,7
41LEB2	2008	NO _x	1510	2081	2528	2800	3186	3473	3871	5204	2081	1882	94,2
41LEB2	2009	NO _x	1469	2038	2446	2686	3040	3330	3735	5293	2035	1883	92,8
41LEB2	2010	NO _x	1791	2633	3302	3652	4102	4493	5004	6068	2633	2348	97,4
41LEB2	2011	NO _x	1606	2325	2946	3269	3687	4085	4633	11044	2383	2081	94,3
41LEB2	2012	NO _x	1739	2436	2946	3262	3655	4014	4653	5791	2434	2206	95,1

Tabel IXd
CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING – UURWAARDEN

KALENDERJAAR
ALLE NIET-WERKDAGEN – ALLE UURWAARDEN van de dag
 Percentielen CO in mg/m³

Post	Jaar	Pol	P ₃₀	P ₅₀	P ₇₀	P ₈₀	P ₉₀	P ₉₅	P ₉₈	P _{99,9}	AM	GM	%Np
41LEC1	2003	CO	6.02	8.00	9.32	9.97	10.89	11.75	12.99	28.44	7.80	7.18	93,9
41LEC1	2004	CO	5,41	6,89	7,88	8,43	9,29	10,26	12,36	34,54	6,80	6,23	93,7
41LEC1	2005	CO	4.58	5.81	6.69	7.19	7.88	8.37	9.11	12.72	5.65	5.28	84,7
41LEC1	2006	CO	3.94	4.90	5.71	6.18	6.85	7.38	7.97	17.77	4.84	4.46	88,5
41LEC1	2007	CO	3.20	4.16	4.77	5.07	5.48	5.89	6.92	16.50	4.01	3.65	58,9
41LEC1	2008	CO	2.91	3.66	4.25	4.55	4.93	5.26	5.73	16.40	3.62	3.34	80,3
41LEC1	2009	CO	2.79	3.43	4.00	4.39	4.81	5.19	5.78	20.03	3.45	3.20	97,1
41LEC1	2010	CO	2.73	3.58	4.39	4.86	5.40	5.93	6.78	17.67	3.61	3.12	87,6
41LEC1	2011	CO	2.32	2.94	3.49	3.85	4.43	5.15	6.22	14.41	3.00	2.67	94,5
41LEC1	2012	CO	1.18	1.68	2.11	2.35	2.76	3.28	4.12	11.31	1.75	1.41	91,9
<hr/>													
41LEB2	2003	CO	6.26	8.21	9.75	10.61	11.85	12.82	14.24	18.42	8.15	7.57	95,4
41LEB2	2004	CO	5.51	7.07	8.26	8.95	9.79	10.98	12.31	18.70	7.03	6.54	94,4
41LEB2	2005	CO	5.03	6.39	7.44	8.01	8.72	9.38	10.62	16.13	6.30	5.90	95,3
41LEB2	2006	CO	4.39	5.45	6.35	6.92	7.64	8.29	9.23	12.75	5.45	5.14	91,7
41LEB2	2007	CO	3.95	4.98	5.82	6.25	6.90	7.50	8.39	13.13	4.95	4.64	96,0
41LEB2	2008	CO	3.11	4.01	4.86	5.37	6.05	6.61	7.21	11.13	4.07	3.72	92,1
41LEB2	2009	CO	2.69	3.46	4.15	4.49	5.02	5.52	6.10	11.00	3.48	3.23	96,4
41LEB2	2010	CO	3.07	4.06	4.90	5.37	6.02	6.58	7.41	9.25	4.07	3.73	96,2
41LEB2	2011	CO	2.48	3.31	4.07	4.52	5.09	5.67	6.54	11.67	3.39	3.06	96,5
41LEB2	2012	CO	2.69	3.34	3.90	4.21	4.58	4.98	5.50	8.43	3.32	3.11	97,5

NO₂ - 41LEC1 - CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING
Alle DAGEN (ALLD) - WERKDAGEN (AWRK) - NIET-WERKDAGEN (NWRK)
JURWAARDEN - JAARPERIODES 2003 tot 2012



NO₂ - 41LEB2 - CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING
Alle DAGEN (ALLD) - WERKDAGEN (AWRK) - NIET-WERKDAGEN (NWRK)
JURWAARDEN - JAARPERIODES 2003 tot 2012





Fig. 5 : NO₂ - Cumulatieve Frequentieverdeling Jurwaarden in beide meetposten van de Leopold II tunnel. Selectie *alle dagen*, *alle werkdagen* en *alle niet-werkdagen* Jaarperiodes 2003 t/m 2012

CO - 41LEC1 - CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING
Alle DAGEN (ALLD) - WERKDAGEN (AWRK) - NIET-WERKDAGEN (NWRK)
JURWAARDEN - JAARPERIODES 2003 tot 2012



CO - 41LEB2 - CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING
Alle DAGEN (ALLD) - WERKDAGEN (AWRK) - NIET-WERKDAGEN (NWRK)
JURWAARDEN - JAARPERIODES 2003 tot 2012





Fig. 6 : CO - Cumulatieve Frequentieverdeling Jurwaarden in beide meetposten van de Leopold II tunnel. Selectie *alle dagen*, *alle werkdagen* en *alle niet-werkdagen*
 Jaarperiodes 2003 t/m 2012

NO - 41LEC1 - CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING
Alle DAGEN (ALLD) - WERKDAGEN (AWRK) - NIET-WERKDAGEN (NWRK)
JURWAARDEN - JAARPERIODES 2003 tot 2012



NO - 41LEB2 - CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING
Alle DAGEN (ALLD) - WERKDAGEN (AWRK) - NIET-WERKDAGEN (NWRK)
JURWAARDEN - JAARPERIODES 2003 tot 2012





Fig. 7 : NO - Cumulatieve Frequentieverdeling Jurwaarden in beide meetposten van de Leopold II tunnel. Selectie *alle dagen*, *alle werkdagen* en *alle niet-werkdagen*
 Jaarperiodes 2003 t/m 2012

NO_x - 41LEC1 - CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING
Alle DAGEN (ALLD) - WERKDAGEN (AWRK) - NIET-WERKDAGEN (NWRK)
JURWAARDEN - JAARPERIODES 2003 tot 2012



NO_x - 41LEB2 - CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING
Alle DAGEN (ALLD) - WERKDAGEN (AWRK) - NIET-WERKDAGEN (NWRK)
JURWAARDEN - JAARPERIODES 2003 tot 2012





Fig. 8 : NO_x - Cumulatieve Frequentieverdeling Urwaarden in beide meetposten van de Leopold II tunnel. Selectie *alle dagen*, *alle werkdagen* en *alle niet-werkdagen*
 Jaarperiodes 2003 t/m 2012

NO₂ - GEMIDDELDE CONCENTRATIE PER MAAND LEOPOLD II TUNNEL



NO - GEMIDDELDE CONCENTRATIE PER MAAND LEOPOLD II TUNNEL





Fig. 9 : NO₂ en NO - Evolutie maandgemiddelde concentratie in beide meetposten van de Leopold II tunnel. Periode "December 2002 – Maart 2013"

NO_x - GEMIDDELDE CONCENTRATIE PER MAAND LEOPOLD II TUNNEL



CO - GEMIDDELDE CONCENTRATIE PER MAAND LEOPOLD II TUNNEL




Fig. 10 : NO_x en CO - Evolutie maandgemiddelde concentratie in beide meetposten van de Leopold II tunnel. Periode "December 2002 – Maart 2013"

VERHOUDING "NO₂/NO_x" PER MAAND LEOPOLD II TUNNEL




Fig. 11 : Evolutive van de verhouding NO₂/NO_x in beide meetposten van de Leopold II tunnel. Periode "December 2002 – Maart 2013"

Concentraties tijdens het spitsuur: over het jaar 2012 bedraagt de gemiddelde NO₂-concentratie op werkdagen tijdens de ochtendspits (5-8 h UT) 615 µg/m³ in de meetpost richting centrum en 576 µg/m³ in de meetpost richting basiliek. Tijdens de avondspits (13-18 h UT) op werkdagen bedraagt de gemiddelde NO₂-concentratie respectievelijk 466 µg/m³ (LEC1) en 921 µg/m³ (LEB2).

Voor de regelmatige tunnelgebruiker die, à rato van 220 werkende dagen per jaar, de tunnel neemt zowel tijdens de ochtendspits (richting centrum) als tijdens de avondspits (richting basiliek) en er telkens 10 minuten opgehouden wordt, betekent dit een bijkomende jaargemiddelde blootstelling van ongeveer 6 à 7 µg/m³:

$$(220/365) * (10/1440) * (615 + 921) = 6,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$$

Voor bewoners van residentiële woongebieden, met een jaargemiddelde NO₂-concentratie van 30 à 32 µg/m³ zou dit een toename betekenen van de jaargemiddelde blootstelling met ca. 20%. Bovendien dreigt dan ook voor deze bewoners de jaargemiddelde blootstelling de grenswaarde voor omgevingslucht (jaargemiddelde van 40 µg/m³ vanaf 2010) te benaderen, of eventueel te overschrijden.

4.3 Overschrijdingen

De tabellen X t/m XIII op blz. 49 tot 56 geven het aantal overschrijdingen weer, per maand en per jaar, van de concentratieniveaus vermeld in het besluit van 22 december 1994. Het betreft de resultaten voor de periode “*december 2002 – maart 2013*”:

voor NO_2 :

- een glijdend 20-minuutsgemiddelde van $1.000 \mu g/m^3$ [NO₂-20 Min]
- een halfuurswaarde (interpolatie) van $850 \mu g/m^3$ [NO₂-HH]
- een uurwaarde van $400 \mu g/m^3$ [NO₂-1 HR]

voor CO :

- een halfuurswaarde van $116 mg/m^3$ (=100 ppm) [CO-HH]

Tabel X geeft de resultaten weer voor het glijdende 20-minuutsgemiddelde voor NO_2 . De twee tabellen op blz. 49 geven het totaal aantal overschrijdingen weer, respectievelijk voor de meetpost LEC1 en LEB2. De beide tabellen op blz. 50 geven het aantal dagen weer met een 20-minuutsgemiddelde hoger dan $1.000 \mu g/m^3$.

Op analoge wijze worden in tabel XI de overschrijdingen weergegeven van de NO_2 -halfuurswaarden hoger dan $850 \mu g/m^3$ en in tabel XII deze van de NO_2 -uurwaarden hoger dan $400 \mu g/m^3$. De overschrijdingen van de halfuurswaarden voor CO ($> 116 mg/m^3$) worden weergegeven in tabel XIII.

De overschrijdingen van de NO_2 -drempel van $1.000 \mu g/m^3$ als 20-minuutsgemiddelde, van $850 \mu g/m^3$ als halfuurswaarde en van $400 \mu g/m^3$ als uurwaarde worden grafisch weergegeven in de figuren 12, 13 en 14 op blz. 57, 58 en 59. De grafieken bovenaan geven telkens het aantal overschrijdingen per maand weer en de grafieken onderaan het aantal dagen per maand met overschrijding.

Voor NO_2 is, in de loop van het jaar 2012, in de meetpost richting basiliek (LEB2), het aantal overschrijdingen van de halfuurswaarden ($850 \mu g/m^3$) en van het glijdende gemiddelde over 20 minuten ($1.000 \mu g/m^3$) met ongeveer 40 percent afgenomen in vergelijking met het jaar 2011. Het aantal overschrijdingen voor de uurwaarden ($400 \mu g/m^3$) is ongeveer gelijk gebleven. Op de meetpost richting centrum (LEC1) is het aantal overschrijdingen van de halfuurswaarden en van het glijdende gemiddelde over 20 minuten met ongeveer één derde afgenomen tegenover 2011. Het aantal uurwaarden in overschrijding is ook met ongeveer één derde afgenomen zodat het aantal overschrijdingen er terugvalt tot het niveau bereikt in 2007. Op beide meetposten is het totaal aantal overschrijdingen van de verschillende drempels voor NO_2 , vastgesteld in 2012, vergelijkbaar met het aantal vastgesteld tijdens de periode 2007-2008.

1.000 µg/m³ NO₂ als 20-minuutswaarde: in 2003 en 2004 was het aantal piekwaarden van de drempelwaarde van 1.000 µg/m³ als 20-minuutsgemiddelde het hoogst op het meetpunt richting centrum (41LEC1). Vanaf het midden van 2005 is het aantal overschrijdingen hoger in de meetpost richting basiliek (41LEB2). Over het kalenderjaar 2012 worden in de meetpost richting basiliek 1.588 overschrijdingen (20-minuutperiodes) vastgesteld, verdeeld over 194 dagen tegenover 710 perioden in 119 dagen voor de meetpost richting centrum.

Voor de meetpost richting basiliek betekent dit een afname van het aantal overschrijdingen met 34% tegenover het jaar 2011, toen er 2.543 perioden in 218 dagen werden vastgesteld. Voor de meetpost richting centrum is het aantal overschrijdingen met 36% afgenomen: 710 perioden in 119 dagen in 2012 tegenover 1.103 perioden in 159 dagen in 2011.

In de meetpost richting centrum (41LEC1) komen de piekwaarden meestal voor op werkdagen, tijdens de ochtendspits. Een aantal situaties waarbij de doorstroming van het verkeer naar de Kleine Ring moeizaam verloopt, b.v. manifestaties, accidenten, etc..., kunnen tot overschrijdingen leiden in de loop van de dag of de (late) namiddag. Overschrijdingen tijdens het weekeinde doen zich vooral voor tijdens de namiddag of de vooravond. Overschrijdingen tijdens de nacht komen uitzonderlijk voor en zijn wellicht te wijten aan onderhoudswerken in de tunnel.

In de richting basiliek (41LEB2) komen de piekwaarden ook overwegend voor op werkdagen, zij het meestal tijdens de avondspits. De overschrijdingen tijdens het weekeinde komen telkens voor tegen het einde van de namiddag. Ook op dit meetpunt zijn de nachtelijke overschrijdingen vermoedelijk het gevolg van onderhoudswerken.

850 µg/m³ NO₂ als halfuurswaarde: de overschrijdingen van deze NO₂-drempel stemmen grotendeels overeen met de overschrijdingen van de drempel van 1.000 µg/m³ voor 20-minuutsgemiddelden.

Voor de meetpost richting basiliek (41LEB2) werd over het jaar 2012 een afname van het aantal overschrijdingen met 34% vastgesteld: 1.598 halfuurswaarden verdeeld over 237 dagen in 2012, tegenover 2.434 halfuurswaarden in 258 dagen gedurende het jaar 2011. Voor de meetpost richting centrum (41LEC1) is het aantal overschrijdingen met ongeveer 36% afgenomen: 617 halfuurswaarden over 153 dagen in 2012 tegen 968 halfuurswaarden over 176 dagen in 2011.

400 µg/m³ NO₂ als uurwaarde: In de meetpost richting basiliek (41LEB2) wordt de drempel van 400 µg/m³ frequent overschreden: met 355 à 503 uurwaarden per maand wordt de drempel in deze meetpost bijna dagelijks (23 à 31 dagen per maand) overschreden, ook tijdens het weekeinde. Per dag zijn er gemiddeld 15 uurwaarden met overschrijding. Over het jaar 2012 is het aantal overschrijdende uurwaarden met 4% afgenomen in vergelijking met het jaar 2011: 5.595 uurwaarden in 357 dagen voor het jaar 2012, tegenover 5.375 uurwaarden in 347 dagen voor 2011.

In de meetpost richting centrum (41LEC1) wordt deze drempel minder frequent overschreden. Verspreid over 17 tot 30 dagen, zijn er tussen de 116 en de 263 overschrijdingen per maand (gemiddeld 6 uurwaarden per dag). Over het jaar 2012 is het aantal uurwaarden in overschrijding met ongeveer 29% afgenomen t.o.v. het jaar 2011: 2.369 uurwaarden verdeeld over 303 dagen in 2012 tegenover 3.345 uurwaarden in 321 dagen in 2011.

Het hogere aantal overschrijdingen van deze waarde in de meetpost richting basiliek stemt overeen met de informatie vervat in de tabellen (tabel IV t/m IX) en de grafieken met de cumulatieve frequentieverdeling (figuur 5): in het meetpunt richting basiliek (41LEB2) is de gemiddelde NO₂-concentratie hoger dan in het meetpunt richting centrum (41LEC1).

116 mg/m³ CO als halfuurswaarde: deze waarde werd tot dusver éénmaal overschreden. Op woensdag 15 september 2004 om 23:30 h UT (16 september om 01:30 h lokale tijd) werd in de meetpost richting centrum (41LEC1) de waarde van 135,69 mg/m³ CO gemeten. Wellicht betreft het hier een overschrijding naar aanleiding van onderhoudswerken in de tunnel.

In de loop van 2012 werden er geen overschrijdingen van deze drempel vastgesteld.

Vaststellingen: Op de meetpost richting basiliek is er een vermindering, met ongeveer 34%, van het aantal piekwaarden hoger dan $1.000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ NO_2 (20-minuutsperiode) en van het aantal halfuurswaarden hoger dan $850 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Het aantal uurwaarden hoger dan $400 \mu\text{g}/\text{m}^3$ NO_2 is met ongeveer 4% afgenomen. Op de meetpost richting centrum is het aantal overschrijdingen van de NO_2 -drempelwaarden van 1000 en $850 \mu\text{g}/\text{m}^3$ met 36% afgenomen t.o.v. het jaar 2011 en er is een afname met ongeveer 29% van het aantal uurwaarden hoger dan $400 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Zoals reeds hoger vermeld, wordt de norm slechts overschreden indien er effectief een blootstelling is gedurende de opgegeven periode. Steekproefsgewijs kan vastgesteld worden dat een oponthoud van één uur in de tunnel niet zeer realistisch is. Een verblijftijd van ca. 20 minuten, b.v. tijdens het spitsuur op plaatsen met de hoogste concentratie (stapvoets verkeer), kan wel (regelmatig) voorkomen.

Het verdient dan ook een aanbeveling om prioritair het optreden van piekconcentraties te verhinderen door het uitwerken van een verbeterd en aanpasbaar ventilatieregime. Hiertoe zou het nuttig zijn om het NO_2 -meetsignaal mee op te nemen in het algoritme voor het opstarten van de ventilatie in de tunnel.

Om het aantal overschrijdingen van de drempel van $400 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (uurwaarde) op korte termijn te laten dalen is een meer permanente ventilatie tijdens de dag noodzakelijk. Maar vermoedelijk wordt het wachten op de eventuele gunstige effecten van Euro_6, die voor nieuwe dieselwagens een lagere NO_x -uitstoot oplegt vanaf 2013/2014, vooraleer de NO_2 -concentraties in de tunnel effectief kunnen beginnen dalen.

Tabel X
NO₂ - GLIJDENDE 20-MINUUTSWAARDEN > 1.000 µg/m³
AANTAL OVERSCHRIJDINGEN per MAAND

LEC1	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	JAAR
2002												73	
2003	19	22	18	34	54	20	0	2	6	2	24	11	212
2004	2	17	18	24	20	32	11	18	26	71	21	18	278
2005	1	11	15	16	17	39	6	2	2	17	47	32	205
2006	14	14	14	28	29	74	9	(0)	63	119	63	49	476
2007	68	33	43	57	40	82	21	10	43	5	90	128	620
2008	59	101	97	115	116	70	21	6	80	124	60	62	911
2009	56	51	39	55	41	49	24	36	67	98	33	34	583
2010	27	7	43	66	40	182	135	(4)	85	152	105	121	967
2011	164	109	67	59	186	124	21	24	69	65	80	135	1.103
2012	17	49	69	88	78	39	54	26	55	110	65	60	710
2013	27	81	43										

LEB2	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	JAAR
2002												13	
2003	5	0	0	8	1	13	12	4	3	0	3	9	58
2004	2	9	20	5	17	29	6	15	72	3	4	2	184
2005	9	10	13	4	38	106	26	51	115	49	16	21	458
2006	6	2	8	27	76	127	85	32	82	80	67	119	711
2007	138	114	108	223	191	203	121	102	81	51	81	118	1.531
2008	84	143	139	102	147	100	70	20	55	189	80	43	1.172
2009	33	83	142	180	119	209	143	191	139	72	55	25	1.391
2010	54	70	572	450	355	519	306	213	303	369	334	157	3.702
2011	8	243	313	262	381	282	202	239	238	219	134	22	2.543
2012	54	78	108	105	169	151	115	136	180	365	75	62	1.588
2013	91	135	138										

Vervolg Tabel X
NO₂ - GLIJDENDE 20-MINUUTSWAARDEN > 1.000 µg/m³
AANTAL DAGEN met OVERSCHRIJDING

LEC1	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	JAAR
2002												13	
2003	6	12	8	7	13	4	0	1	3	1	7	4	66
2004	2	7	7	4	6	9	3	3	6	16	6	5	74
2005	1	3	3	3	4	10	2	1	1	5	12	9	54
2006	4	5	6	7	10	12	2	(0)	18	18	15	7	104
2007	14	9	13	10	9	15	5	5	10	2	17	14	123
2008	13	17	16	16	19	15	3	1	15	18	14	12	159
2009	9	13	10	11	9	10	4	7	12	15	8	7	115
2010	5	3	8	14	11	20	14	(3)	19	18	14	17	146
2012	22	16	11	9	21	17	4	6	11	14	12	16	159
2012	4	11	11	14	11	9	7	5	12	15	9	11	119
2013	6	9	11										

LEB2	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	JAAR
2002												5	
2003	3	0	0	3	1	7	3	3	2	0	2	3	27
2004	1	3	6	2	3	9	3	7	11	2	2	1	50
2005	3	4	3	2	7	11	7	13	17	10	6	7	90
2006	2	2	4	8	13	18	15	10	17	16	13	17	135
2007	20	13	16	21	20	21	18	20	14	15	17	17	212
2008	21	22	17	13	14	14	14	7	12	16	14	15	179
2009	7	17	17	17	17	19	18	21	19	13	14	7	186
2010	16	15	27	25	20	27	22	20	22	24	21	14	253
2011	4	19	23	23	25	22	18	21	21	22	17	3	218
2012	10	14	17	16	19	18	17	19	20	22	12	10	194
2013	17	18	18										

Tabel XI
NO₂-HALFUURSWAARDEN > 850 µg/m³
AANTAL OVERSCHRIJDINGEN per MAAND

LEC1	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	JAAR
2002												52	
2003	13	14	9	24	41	12	1	1	4	10	16	7	152
2004	3	11	14	19	14	21	7	11	20	41	18	10	189
2005	3	8	8	9	11	28	4	1	2	20	40	26	160
2006	10	11	20	22	23	59	6	(0)	52	82	58	45	388
2007	53	37	44	50	39	65	16	9	39	9	73	100	534
2008	59	88	73	89	92	59	16	3	76	90	55	53	753
2009	45	35	27	55	42	53	18	23	49	98	32	23	500
2010	29	11	64	82	60	212	123	(15)	106	142	121	145	1.110
2011	175	107	54	50	123	94	16	15	68	64	83	119	968
2012	17	40	59	73	64	37	39	19	49	97	66	57	617
2013	23	70	55										

LEB2	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	JAAR
2002												19	
2003	5	1	4	7	7	22	11	13	5	0	2	13	90
2004	2	8	17	6	15	30	6	24	69	5	5	3	190
2005	6	13	12	12	48	97	29	59	118	58	31	26	509
2006	7	6	13	43	92	128	69	36	81	118	104	135	832
2007	171	168	145	227	195	207	121	94	108	88	126	159	1.809
2008	113	192	187	149	171	105	81	26	50	157	85	51	1.367
2009	58	126	161	160	114	194	131	152	126	108	90	47	1.467
2010	101	125	571	465	401	471	279	203	329	393	356	167	3.861
2011	7	235	297	278	335	265	179	228	225	206	159	20	2.434
2012	100	102	121	110	166	130	104	124	143	305	89	104	1.598
2013	122	125	132										

Vervolg Tabel XI
NO₂-HALFUURSWAARDEN > 850 µg/m³
AANTAL DAGEN met OVERSCHRIJDING

LEC1	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	JAAR
2002												17	
2003	6	12	7	9	12	4	1	1	3	5	6	5	71
2004	3	7	7	5	7	9	3	3	8	15	8	6	81
2005	2	5	3	3	4	10	2	1	1	10	14	9	64
2006	4	6	10	8	10	16	2	(0)	20	19	17	12	124
2007	15	14	17	10	15	16	6	5	13	5	20	17	153
2008	15	20	17	18	20	18	4	1	20	19	17	13	182
2009	13	12	10	13	12	15	4	8	13	22	12	8	142
2010	10	6	18	16	15	23	16	(9)	23	24	15	21	196
2011	23	17	13	11	20	17	4	5	13	17	18	18	176
2012	6	12	15	14	14	12	7	7	16	21	15	14	153
2013	9	11	16										

LEB2	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	JAAR
2002												7	
2003	5	1	2	3	5	12	5	8	4	0	2	8	55
2004	1	5	8	4	5	10	4	13	15	3	3	2	73
2005	3	7	5	6	11	15	9	19	21	17	14	10	137
2006	5	4	7	12	18	20	17	14	19	21	18	21	176
2007	23	20	19	22	20	22	20	19	19	22	22	21	249
2008	24	24	22	19	18	19	17	14	13	20	17	16	223
2009	14	22	23	19	19	23	20	21	21	22	17	16	237
2010	22	21	29	27	27	27	22	23	26	29	26	15	294
2011	6	23	27	25	27	24	22	25	27	25	22	5	258
2012	20	20	20	18	20	20	18	22	21	25	15	18	237
2013	23	20	19										

Tabel XII
NO₂-UURWAARDEN > 400 µg/m³
AANTAL OVERSCHRIJDINGEN per MAAND

LEC1	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	JAAR
2002												74	
2003	67	94	69	76	81	87	33	80	68	95	61	60	871
2004	21	46	84	86	91	100	56	67	122	140	78	58	949
2005	37	72	73	53	86	158	21	37	99	152	127	135	1.050
2006	139	162	252	162	155	201	149	(28)	252	231	229	172	2.132
2007	167	250	313	285	196	246	124	136	204	126	270	292	2.609
2008	300	370	355	359	340	231	134	111	273	243	279	280	3.275
2009	291	252	221	215	256	288	134	222	221	281	192	258	2.831
2010	300	250	445	471	503	491	465	(251)	433	458	421	491	4.979
2011	482	343	306	363	336	251	132	187	204	180	262	299	3.345
2012	170	167	275	263	254	185	118	116	170	251	213	187	2.369
2013	171	254	334										

LEB2	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	JAAR
2002												215	
2003	249	278	312	356	332	335	251	244	284	298	240	299	3.478
2004	259	275	372	295	293	329	255	275	359	338	295	319	3.664
2005	313	297	309	355	335	381	290	341	394	386	352	372	4.125
2006	388	389	413	393	398	420	305	288	353	466	454	487	4.754
2007	510	448	428	514	505	453	448	433	433	460	465	498	5.595
2008	478	499	505	507	493	469	414	361	408	482	371	371	5.358
2009	368	463	516	463	444	475	410	462	393	418	480	472	5.364
2010	492	481	516	534	566	545	516	484	493	535	529	441	6.132
2011	246	439	519	540	533	494	496	466	454	490	465	233	5.375
2012	503	469	501	498	501	488	447	438	452	451	355	492	5.595
2013	487	463	521										

Vervolg Tabel XII
NO₂-UURWAARDEN > 400 µg/m³
AANTAL DAGEN met OVERSCHRIJDING

LEC1	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	JAAR
2002												17	
2003	19	21	22	18	18	19	8	16	16	26	21	16	220
2004	12	20	23	18	18	23	12	17	24	26	22	20	235
2005	15	18	20	13	17	22	9	13	21	22	21	24	215
2006	22	25	28	20	22	26	20	(8)	28	27	30	20	276
2007	23	26	31	29	24	27	26	24	25	23	27	29	314
2008	29	29	31	30	30	25	20	23	29	27	29	26	328
2009	28	27	24	19	27	26	24	27	23	28	25	28	306
2010	27	26	31	30	31	30	31	(21)	30	29	30	31	346
2011	31	28	30	30	30	24	20	25	26	23	26	28	321
2012	24	25	30	28	28	23	17	25	25	28	27	23	303
2013	25	26	30										

LEB2	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	JAAR
2002												26	
2003	26	25	30	29	30	30	29	26	27	30	27	29	338
2004	29	28	31	28	28	29	25	29	30	30	28	30	345
2005	29	27	28	30	31	29	29	30	29	31	30	31	354
2006	31	28	30	29	31	29	25	30	28	31	30	31	353
2007	31	27	26	30	31	28	31	31	30	31	30	31	357
2008	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	25	26	356
2009	29	28	31	29	29	30	29	31	26	29	30	30	351
2010	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
2011	31	28	31	30	30	29	31	31	29	30	28	19	347
2012	31	29	31	30	31	30	31	31	30	29	23	31	357
2013	31	28	31										

Tabel XIII
CO-HALFUURSWAARDEN > 116 mg/m³
AANTAL OVERSCHRIJDINGEN per MAAND

LEC1	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	JAAR
2002												0	
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0										


LEB2	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	JAAR
2002												0	
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0										

Vervolg Tabel XIII
CO-HALFUURSWAARDEN > 116 mg/m³
AANTAL DAGEN met **OVERSCHRIJDING**

LEC1	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	JAAR
2002												0	
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0										

LEB2	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	JAAR
2002												0	
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0										

NO₂ - AANTAL 20-Min PERIODES > 1.000 µg/m³
TUNNEL LEOPOLD II - AANTAL OverschRIJDINGEN PER MAAND



NO₂ - 20-Min GEMIDDELDEN > 1.000 µg/m³
TUNNEL LEOPOLD II - AANTAL DAGEN MET OverschRIJDING PER MAAND





Fig. 12 : NO₂ – 20-Minutsgemiddelden > 1.000 µg/m³. Totaal aantal overschrijdingen per maand en aantal dagen per maand met overschrijding (december 2002 – maart 2013)

NO₂ - AANTAL HALFUURSWAARDEN > 850 µg/m³
TUNNEL LEOPOLD II - AANTAL OverschRIJDINGEN PER MAAND



NO₂ - HALFUURSWAARDEN > 850 µg/m³
TUNNEL LEOPOLD II - AANTAL DAGEN MET OverschRIJDING PER MAAND





Fig. 13 : NO₂ – Halfuurswaarden > 850 µg/m³. *Totaal aantal overschrijdingen per maand en aantal dagen per maand met overschrijding (december 2002 – maart 2013)*

NO₂ - AANTAL UURWAARDEN > 400 µg/m³
TUNNEL LEOPOLD II - AANTAL OverschRIJDINGEN PER MAAND



NO₂ - UURWAARDEN > 400 µg/m³
TUNNEL LEOPOLD II - AANTAL DAGEN MET OverschRIJDING PER MAAND




Fig. 14 : NO₂-Uurwaarden > 400 µg/m³. Totaal aantal overschrijdingen per maand en aantal dagen per maand met overschrijding (december 2002 – maart 2013)

4.4 Gemiddeld Dagverloop

In de grafieken van de figuren 15 t/m 20 wordt het dagverloop weergegeven voor een gemiddelde zondag, een gemiddelde zaterdag en een gemiddelde werkdag. De grafiek bovenaan geeft telkens de resultaten weer voor de winterperiode oktober 2012 – maart 2013 en de grafiek onderaan de resultaten voor de zomerperiode april – september 2012.

De NO₂-resultaten worden weergegeven in de figuren 15 en 16, respectievelijk voor de meetposten richting centrum (LEC1) en basiliek (LEB2). De NO-resultaten voor de meetpost richting centrum (LEC1) bevinden zich in figuur 17 en deze voor de meetpost richting basiliek (LEB2) in figuur 18. Het CO-dagverloop voor beide meetposten wordt respectievelijk weergegeven in figuur 19 en 20.

Hoewel er geen grote concentratieverschillen worden opgetekend, zijn de concentraties voor NO₂, NO en CO gemiddeld hoger op werkdagen dan op niet-werkdagen en gemiddeld hoger op zaterdag dan op zondag. Tijdens de nacht van zaterdag op zondag zijn de concentraties hoger dan tijdens de nachten van de week (zie resultaten gemiddelde zaterdag na 18:00 h UT).

In de meetpost richting centrum (LEC1) wordt, voor de gemiddelde werkdag van de winterperiode *oktober 2012 – maart 2013*, een duidelijke ochtendpiek vastgesteld (zie grafieken bovenaan in de figuren 15, 17 en 19). Ook tijdens de zomerperiode *april – september 2012* wordt voor deze pollutanten een ochtendpiek geregistreerd (grafieken onderaan de figuren 15, 17 en 19). De gemiddeld hogere concentraties voor NO₂ en CO tijdens de ochtendpiek wijzen op het regelmatig voorkomen van filevorming aan het einde van de tunnel, in de richting van het centrum.

In de meetpost richting basiliek (41LEB2) is er, voor de werkdagen tijdens de winterperiode 2012/2013, een geringe verhoging van de concentratie tijdens de ochtendspits. In de late namiddag tot de avond is er permanent een hogere concentratie (grafieken bovenaan in de figuren 16, 18 en 20).

Tijdens de zomerperiode van 2012 is er over het algemeen een verhoogde concentratie tijdens de namiddag en de avond. Voor NO₂ is er ook tijdens de zomerperiode een avondpiek waarneembaar (grafiek onderaan figuur 16).





Fig. 15 : NO₂-dagverloop in de meetpost 41LEC1 (richting centrum)
 Vergelijking voor een gemiddelde zondag, zaterdag en werkdag
 Winterperiode 2012-2013 en zomerperiode 2012






Fig. 16 : NO₂-dagverloop in de meetpost 41LEB2 (richting basiliek)
 Vergelijking voor een gemiddelde zondag, zaterdag en werkdag
 Winterperiode 2012-2013 en zomerperiode 2012

NO at 41LEC1 - TUNNEL LEOPOLD II - Centre
Average SUNDAY, SATURDAY and WORKING DAY
 Winter Period : October 2012 - March 2013



NO at 41LEC1 - TUNNEL LEOPOLD II - Centre
Average SUNDAY, SATURDAY and WORKING DAY
 Summer Period : April - September 2012





Fig. 17 : NO-dagverloop in de meetpost 41LEC1 (richting centrum)
 Vergelijking voor een gemiddelde zondag, zaterdag en werkdag
 Winterperiode 2012-2013 en zomerperiode 2012

NO at 41LEB2 - TUNNEL LEOPOLD II - Basilica
Average SUNDAY, SATURDAY and WORKING DAY
 Winter Period : October 2012 - March 2013



NO at 41LEB2 - TUNNEL LEOPOLD II - Basilica
Average SUNDAY, SATURDAY and WORKING DAY
 Summer Period : April - September 2012





Fig. 18 : NO-dagverloop in de meetpost 41LEB2 (richting basiliek)
 Vergelijking voor een gemiddelde zondag, zaterdag en werkdag
 Winterperiode 2012-2013 en zomerperiode 2012

CO at 41LEC1 - TUNNEL LEOPOLD II - Centre
Average SUNDAY, SATURDAY and WORKING DAY
 Winter Period : October 2012 - March 2013



CO at 41LEC1 - TUNNEL LEOPOLD II - Centre
Average SUNDAY, SATURDAY and WORKING DAY
 Summer Period : April - September 2012





Fig. 19 : CO-dagverloop in de meetpost 41LEC1 (richting centrum)
 Vergelijking voor een gemiddelde zondag, zaterdag en werkdag
 Winterperiode 2012-2013 en zomerperiode 2012

CO at 41LEB2 - TUNNEL LEOPOLD II - Basilica
Average SUNDAY, SATURDAY and WORKING DAY
 Winter Period : October 2012 - March 2013



CO at 41LEB2 - TUNNEL LEOPOLD II - Basilica
Average SUNDAY, SATURDAY and WORKING DAY
 Summer Period : April - September 2012




Fig. 20 : CO-dagverloop in de meetpost 41LEB2 (richting basiliek)
 Vergelijking voor een gemiddelde zondag, zaterdag en werkdag
 Winterperiode 2012-2013 en zomerperiode 2012

4.5 Gemiddeld Weekverloop

In de figuren 21 t/m 26 wordt het gemiddeld weekverloop van de gemeten parameters grafisch weergegeven. De figuren 21 en 22 geven, respectievelijk voor de meetpost LEC1 (centrum) en LEB2 (basiliek), het verloop weer van het gemiddelde NO₂-weekverloop. De figuren 23 en 24 geven het weekverloop weer voor CO en de figuren 25 en 26 het weekverloop voor NO. In de grafieken worden per uurperiode het rekenkundig gemiddelde (AVG), de mediaan (P50) en de percentielen P10 en P90 uitgezet. Deze beide laatste waarden begrenzen ongeveer het gebied waarin de concentratie van dag tot dag schommelt.

De figuren bovenaan verwijzen naar de winterperiode “oktober 2012 – maart 2013” en de figuren onderaan naar de zomerperiode “april – september 2012”. De concentraties zijn gemiddeld hoger op werkdagen dan op weekenddagen en hoger op zaterdag dan op zondag.

Op de meetpost richting centrum (LEC1) worden tijdens de winterperiode 2012/2013 (grafieken bovenaan in de figuren 21, 23 en 25) op bijna alle werkdagen van de week piekconcentraties vastgesteld tijdens de ochtendspits: zowel de P90, de mediaan (P50) als de gemiddelde concentratie (AVG) zijn duidelijk hoger dan de concentratie tijdens de rest van de dag. Ook tijdens de namiddag worden er soms hoge piekconcentraties vastgesteld.

Voor de zomerperiode 2012 (grafieken onderaan in de figuren 21, 23 en 25) is de ochtendpiek ook duidelijk merkbaar in de evolutie van de P90-waarde, de P50-waarde (mediaan) en in de gemiddelde concentratie.


Met uitzondering van de ochtendpiek tijdens de winterperiode, is er een relatief geringe spreiding tussen de resultaten voor P10 en P90. Dit wijst erop dat de concentraties in dit tunnelsegment van dag tot dag (per type dag) niet erg verschillend zijn. Op de bovengrondse meetpunten, ter controle van de kwaliteit van de omgevingslucht, wordt een veel ruimere spreiding van de resultaten vastgesteld.

In de tunnel zijn de concentraties ruim hoger dan in de buitenlucht. Bij een min of meer constant dagpatroon aan emissies (verkeer) wordt de gemeten concentratie vooral bepaald door de luchtverversing. In de tunnel wordt dit geregeld door het ventilatiedebiet (natuurlijk of geforceerd). In de omgevingslucht is de meteorologische situatie (windsnelheid, temperatuurgradiënt, etc...) bepalend voor de goede of minder goede verspreiding van de vervuiling.

Op het meetpunt richting basiliek (LEB2) komen de hoogste concentraties voor tijdens de namiddag en de vooravond. Het verloop van de P90-waarde tijdens de winterperiode wijst op pieken tijdens de avondspits. Op dit meetpunt zijn de avondlijke piekconcentraties breder dan de ochtendlijke piekconcentraties op het andere meetpunt.

Ook tijdens de zomerperiode worden er tijdens de avondspits hogere waarden vastgesteld voor de percentiel P90, de mediaan en het gemiddelde. Voor NO₂ is de verhouding tussen de concentratie in de tunnel en deze in de omgevingslucht minder groot dan dat dit het geval is voor NO en CO. Tijdens de zomerperiode wordt de NO₂-concentratie in de tunnel nog in lichte mate beïnvloed door deze van de omgevingslucht (extra NO₂ ten gevolge van fotochemische activiteit).

NO₂ - LEOPOLD II TUNNEL, richting CENTRUM (LEC1)
GEMIDDELD WEEKVERLOOP UURWAARDEN
WINTERPERIODE : OKTOBER 2012 - MAART 2013



NO₂ - LEOPOLD II TUNNEL, richting CENTRUM (LEC1)
GEMIDDELD WEEKVERLOOP UURWAARDEN
ZOMERPERIODE : APRIL - SEPTEMBER 2012





Fig. 21 : Meetpost 41LEC1 (centrum) - Gemiddeld weekverloop voor NO₂
 Vergelijking winterperiode 2012 - 2013 en zomerperiode 2012

NO₂ - LEOPOLD II TUNNEL, richting BASILIEK (LEB2)
GEMIDDELD WEEKVERLOOP UURWAARDEN
WINTERPERIODE : OKTOBER 2012 - MAART 2013



NO₂ - LEOPOLD II TUNNEL, richting BASILIEK (LEB2)
GEMIDDELD WEEKVERLOOP UURWAARDEN
ZOMERPERIODE : APRIL - SEPTEMBER 2012





Fig. 22 : Meetpost 41LEB2 (basiliek) - Gemiddeld weekverloop voor NO₂
 Vergelijking winterperiode 2012 - 2013 en zomerperiode 2012

CO - LEOPOLD II TUNNEL, richting CENTRUM (LEC1)
GEMIDDELD WEEKVERLOOP UURWAARDEN
WINTERPERIODE : OKTOBER 2012 - MAART 2013



CO - LEOPOLD II TUNNEL, richting CENTRUM (LEC1)
GEMIDDELD WEEKVERLOOP UURWAARDEN
ZOMERPERIODE : APRIL - SEPTEMBER 2012





Fig. 23 : Meetpost 41LEC1 (centrum) - Gemiddeld weekverloop voor CO
 Vergelijking winterperiode 2012 - 2013 en zomerperiode 2012

CO - LEOPOLD II TUNNEL, richting BASILIEK (LEB2)
GEMIDDELD WEEKVERLOOP UURWAARDEN
WINTERPERIODE : OKTOBER 2012 - MAART 2013



CO - LEOPOLD II TUNNEL, richting BASILIEK (LEB2)
GEMIDDELD WEEKVERLOOP UURWAARDEN
ZOMERPERIODE : APRIL - SEPTEMBER 2012





Fig. 24 : Meetpost 41LEB2 (basiliek) - Gemiddeld weekverloop voor CO
 Vergelijking winterperiode 2012 - 2013 en zomerperiode 2012

NO - LEOPOLD II TUNNEL, richting CENTRUM (LEC1)
GEMIDDELD WEEKVERLOOP UURWAARDEN
WINTERPERIODE : OKTOBER 2012 - MAART 2013



NO - LEOPOLD II TUNNEL, richting CENTRUM (LEC1)
GEMIDDELD WEEKVERLOOP UURWAARDEN
ZOMERPERIODE : APRIL - SEPTEMBER 2012





Fig. 25 : Meetpost 41LEC1 (centrum) - Gemiddeld weekverloop voor NO
 Vergelijking winterperiode 2012 - 2013 en zomerperiode 2012

NO - LEOPOLD II TUNNEL, richting BASILIEK (LEB2)
GEMIDDELD WEEKVERLOOP UURWAARDEN
WINTERPERIODE : OKTOBER 2012 - MAART 2013



NO - LEOPOLD II TUNNEL, richting BASILIEK (LEB2)
GEMIDDELD WEEKVERLOOP UURWAARDEN
ZOMERPERIODE : APRIL - SEPTEMBER 2012




Fig. 26 : Meetpost 41LEB2 (basiliek) - Gemiddeld weekverloop voor NO
 Vergelijking winterperiode 2012 - 2013 en zomerperiode 2012

4.6 Resultaten voor een autoluwe zondag

Op zondag 16 september 2012 werd, in het kader van een Europese actie, door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest reeds voor de elfde maal een autoluwe zondag georganiseerd. Tussen 9 en 19 h lokale tijd (7 tot 17 h UT) was het gemotoriseerde privé vervoer nagenoeg integraal verboden over het totale grondgebied van het Gewest. Er zijn enkel uitzonderingen voor de bussen van de vervoermaatschappij MIVB, een aantal taxi's en een paar duizend toegekende aanvragen. Tijdens de autoluwe periode is de snelheid beperkt tot 30 km/hr.

In de grafieken van de figuren 27 t/m 32 wordt het dagverloop weergegeven voor de autoluwe zondag, een gemiddelde zondag en een gemiddelde werkdag. De grafieken bovenaan geven telkens de resultaten weer voor de autoluwe zondag van 16 september 2012 en de grafieken onderaan de resultaten uitgemiddeld over de elf autoluwe zondagen in de periode 2002-2012.

De NO₂-resultaten worden weergegeven in de figuren 27 en 28, respectievelijk voor de meetposten richting centrum (LEC1) en basiliek (LEB2). De NO-resultaten voor de meetpost centrum bevinden zich in figuur 29 en deze voor de richting basiliek in figuur 30. Het verloop voor de CO-concentratie wordt weergegeven in de figuren 31 en 32.

De grafieken bovenaan in de figuren geven het verloop weer van 3 reeksen gegevens: evolutie van de halfuurswaarden van de autoluwe zondag (16 september 2012), het dagverloop van een gemiddelde zondag uit de periode "1 mei - 15 september 2012" en het dagverloop van een gemiddelde werkdag uit dezelfde periode..

De grafieken onderaan in de figuren geven het verloop weer van de concentraties uitgemiddeld over de elf autoluwe zondagen en vergelijken deze met het verloop van een gemiddelde zondag en een gemiddelde werkdag voor de periodes 'mei – september' van de jaargangen 2002 t/m 2012.

Uit de grafieken van de onderscheiden parameters kan opgemaakt worden dat, op de autoluwe zondag, de concentraties in de tunnel tijdens de sperperiode voor het verkeer drastisch lager zijn dan op een gemiddelde zondag.

In beide meetposten wordt vrijwel meteen vanaf het begin en voor de totale duur van de sperperiode, vanaf 7 h UT (9 h lokale tijd) tot 17 h UT (19 h lokale tijd), een afname van de concentraties vastgesteld. Na het einde van de sperperiode nemen de concentraties zeer snel toe en reeds binnen het halfuur worden opnieuw de gangbare concentraties in de tunnel bereikt.




Fig. 27.a : NO₂ in de Leopold II tunnel, richting Centrum – Dagprofiel autoluwe zondag 16-09-2012, gemiddelde zondag en gemiddelde werkdag in de periode ‘mei – september 2012’




Fig. 27.b : NO₂ in de Leopold II tunnel, richting Centrum – Gemiddelde Dagprofiel van de elf autoluwe zondagen en van alle zondagen en werkdagen in de periodes ‘mei – september 2002-2012’




Fig. 28.a : NO₂ in de Leopold II tunnel, richting Basiliek – Dagprofiel autoluwe zondag 16-09-2012, gemiddelde zondag en een gemiddelde werkdag in de periode ‘mei – september 2012’




Fig. 28.b : NO₂ in de Leopold II tunnel, richting Basiliek – Gemiddelde Dagprofiel van de elf autoluwe zondagen en van alle zondagen en werkdagen in de periodes ‘mei – september 2002-2012’




Fig. 29.a : NO in de Leopold II tunnel, richting Centrum – Dagprofiel autoluwe zondag 16-09-2012, gemiddelde zondag en gemiddelde werkdag in de periode ‘mei – september 2012’




Fig. 29.b : NO in de Leopold II tunnel, richting Centrum – Gemiddelde Dagprofiel van de elf autoluwe zondagen en van alle zondagen en werkdagen in de periodes ‘mei – september 2002-2012’




Fig. 30.a : NO in de Leopold II tunnel, richting Basiliek – Dagprofiel autoluwe zondag 16-09-2012, gemiddelde zondag en een gemiddelde werkdag in de periode ‘mei – september 2012’




Fig. 30.b : NO in de Leopold II tunnel, richting Basiliek – Gemiddelde Dagprofiel van de elf autoluwe zondagen en van alle zondagen en werkdagen in de periodes ‘mei – september 2002-2012’




Fig. 31.a : CO in de Leopold II tunnel, richting Centrum – Dagprofiel autoluwe zondag 16-09-2012, gemiddelde zondag en gemiddelde werkdag in de periode ‘mei – september 2012’




Fig. 31.b : CO in de Leopold II tunnel, richting Centrum – Gemiddelde Dagprofiel van de elf autoluwe zondagen en van alle zondagen en werkdagen in de periodes ‘mei – september 2002-2012’




Fig. 32.a : CO in de Leopold II tunnel, richting Basiliek – Dagprofiel autoluwe zondag 16-09-2012, gemiddelde zondag en een gemiddelde werkdag in de periode ‘mei – september 2012’




Fig. 32.b : CO in de Leopold II tunnel, richting Basiliek – Gemiddelde Dagprofiel van de elf autoluwe zondagen en van alle zondagen en werkdagen in de periodes ‘mei – september 2002-2012’

4.7 Vergelijking Tunnel en Meetposten Verkeer

Het niveau van de concentraties in de tunnel is meerdere malen hoger dan het niveau vastgesteld in de omgevingslucht, op meetplaatsen met druk verkeer.

Het telemetrisch meetnet ter controle van de luchtkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft enkele meetposten die (min of meer) specifiek op het verkeer gericht zijn, o.a. de meetpost in de voorhaven (N043), en de meetpost in de Kroonlaan te Elsene (R002), een “canyon”-straat met relatief veel verkeer.

Voor de werkdagen tijdens de winterperiode oktober 2012 – maart 2013 wordt het gemiddeld dagverloop, vastgesteld op deze plaatsen, vergeleken met dit van de meetpunten in de Leopold II tunnel. Voor CO worden de resultaten weergegeven in figuur 33 en voor NO₂ en NO in figuur 34.

Voor CO en NO zijn de gemiddelde concentraties in de tunnel ruim 10 maal hoger en voor NO₂ ongeveer 5 à 10 maal hoger dan op verkeersdrukke plaatsen in de buitenlucht.




Fig. 33 : CO-dagverloop voor een gemiddelde werkdag tijdens de winter 2012-2013
Meetposten verkeer in de omgevingslucht – Voorhaven (N043) en Kroonlaan (R002)
Meetposten in de tunnel Leopold II – LEC1 (centrum) en LEC2 (basiliek)





Fig. 34 : Dagverloop NO₂ en NO voor een gemiddelde werkdag tijdens de winter 2012-2013
 Meetposten verkeer in de omgevingslucht – Voorhaven (N043) en Kroonlaan (R002)
 Meetposten in de tunnel Leopold II – LEC1 (centrum) en LEC2 (basiliek)

Samenvatting

Meetposten: in de loop van het jaar 2002 werden twee permanente meetposten opgericht in de Leopold II tunnel, één in elke richting. Eén van de meetposten, met codenaam 41LEC1, bevindt zich in het tunnelsegment richting centrum. Het aanzuigpunt van de lucht bevindt zich op enkele honderden meter van het einde van de tunnel (hulppost 111), waar er een behoorlijke kans bestaat op filevorming, b.v. tijdens de ochtendspits en telkens er een ernstige verstoring van het verkeer is in de binnenstad (b.v. ten gevolge van manifestaties).

De andere meetpost, met codenaam 41LEB2, bevindt zich in de technische lokalen van het Simoniscomplex. Het aanzuigpunt bevindt zich in het tunnelsegment richting basiliek (Koekelberg), op meerdere honderden meters van het einde van de tunnel. Door de aanwezigheid van verkeerslichten aan het einde van de tunnel (uitgang ter hoogte van de basiliek) kunnen de gevolgen van de filevorming zich tot op dit meetpunt laten gevoelen (b.v. tijdens een drukke avondspits).

Reglementering: het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (22 december 1994), betreffende de luchtkwaliteit in wegtunnels, vermeldt grenswaarden voor CO en NO₂ die niet mogen overschreden worden:

- Voor koolmonoxide (CO):
 - o 100 ppm gemiddeld voor de monsterneming en de analysetoestellen in de beschouwde tunnel, voor een maximumblootstelling van een half uur
- Voor stikstofdioxide (NO₂):
 - o 1.000 µg/m³ (microgram per kubieke meter) voor een maximum blootstelling van 20 minuten
 - o 400 µg/m³ (microgram per kubieke meter) voor een blootstelling van één uur
 - o een lineaire variatie tussen de twee hierboven vermelde waarden voor een blootstelling van 20 minuten tot één uur (b.v. 850 µg/m³ voor 30 minuten)

Grenswaarden voor de luchtkwaliteit in tunnels koppelen expliciet de duur van de blootstelling aan de opgegeven concentratie. Dit betekent dat de uurwaarde voor NO₂ niet meer dan 400 µg/m³ mag bedragen als er een effectieve blootstelling is gedurende één uur.

Steekproefsgewijs kan vastgesteld worden dat autobestuurders slechts uitzonderlijk gedurende langere tijd, b.v. één uur, opgehouden worden in de Leopold II tunnel. Daarentegen is het best mogelijk dat zij regelmatig gedurende 10 tot 20 minuten opgehouden worden in deze tunnel, b.v. tijdens de ochtend- of de avondspits. Bij langzaam verkeer of filevorming verhoogt de uitstoot aan NO₂ en CO. De bestuurders verblijven zo het langst op de plaatsen met de hoogste concentraties voor deze pollutanten.

Resultaten: Voor CO geldt een grenswaarde van 100 ppm (= 116,5 mg/m³) voor een blootstelling gedurende 30 minuten. Over het kalenderjaar 2012 worden er geen overschrijdingen vastgesteld van deze grenswaarde voor CO.

Voor NO₂ geldt een grenswaarde van 400 µg/m³ voor een blootstelling gedurende één uur en een grenswaarde van 850 µg/m³ voor een blootstelling gedurende 30 minuten. Het niveau van 850 µg/m³ bij de halfuurswaarden situeert zich tussen de centielen P95 en P98 in de meetpost LEC1 en tussen P90 en P95 in de meetpost LEB2. Het aantal overschrijdingen van dit niveau is hoger dan het aantal vastgesteld in 2008 en 2009 met telkens ongeveer 2% van de halfuurswaarden in LEC1 en ongeveer 10% in LEB2, maar minder hoog dan in 2010 of 2011.

Voor de meetpost richting basiliek (41LEB2) werd over het jaar 2012 een vermindering van het aantal overschrijdingen met 34% vastgesteld: 1.598 halfuurswaarden verdeeld over 237 dagen in 2012, tegenover 2.434 halfuurswaarden in 258 dagen gedurende het jaar 2011. Voor de meetpost richting centrum (41LEC1) is het aantal overschrijdingen met 36% afgenomen: 617 halfuurswaarden in 153 dagen in 2012 tegen 968 halfuurswaarden over 176 dagen in 2011.

Het niveau van 400 µg/m³ bij de uurwaarden situeert zich tussen de centielen P70 en P80 voor de meetpost 41LEC1 en tussen P30 en P40 voor de meetpost 41LEB2. Dit betekent dat het aantal uurwaarden hoger dan 400 µg/m³ meer dan 30% uitmaakt van het totaal aantal uurperiodes voor de meetpost richting centrum (41LEC1) en meer dan 60% voor de meetpost richting basiliek (41LEB2).

Voor de meetpost richting basiliek (41LEB2) bedraagt het aantal uurwaarden hoger dan 400 µg/m³ meer dan 70% van het aantal uurwaarden op *werkdagen* en iets meer dan 60% van het aantal uurwaarden op *niet-werkdagen*. Voor de meetpost richting centrum (41LEC1) bedraagt dit meer dan 30% van het aantal uurwaarden op *werkdagen* en ongeveer 10% van het aantal uurwaarden op *niet-werkdagen*.

De gemiddelde NO₂-uurwaarde voor het jaar 2012 bedraagt 351 µg/m³ in de meetpost 41LEC1 en 530 µg/m³ in de meetpost richting basiliek. Tussen 2006 en 2010 is de gemiddelde NO₂-concentratie toegenomen. In 2011 daalt de gemiddelde concentratie in beide segmenten, maar ze blijft hoger dan tijdens de periode 2006-2009. In 2012 vallen de niveaus terug tot deze opgetekend in 2007.

De tabel hierna geeft de evolutie weer van de jaargemiddelde NO₂-concentratie in beide tunnelsegmenten, alsook van de gemiddelde concentratie op werkdagen en niet-werkdagen.

NO₂ – Evolutie GEMIDDELDE CONCENTRATIE [in µg/m³]

Jaar	Jaargemiddelde Alle Dagen		Gemiddelde Werkdagen		Gemiddelde Niet-Werkdagen	
	LEC1	LEB2	LEC1	LEB2	LEC1	LEB2
2003	278	363	297	391	235	302
2004	279	375	298	404	235	309
2005	283	409	305	444	233	333
2006	338	455	365	490	281	379
2007	350	539	375	577	295	456
2008	376	506	404	541	316	425
2009	371	526	398	561	309	448
2010	485	631	513	666	422	550
2011	409	582	440	613	344	519
2012	351	530	373	560	303	465

Voor alle pollutanten zijn de gemeten concentraties *gemiddeld hoger* op werkdagen dan op niet-werkdagen. Over het jaar 2012 bedraagt de gemiddelde uurwaarde voor NO₂ op werkdagen 373 µg/m³ (41LEC1) en 560 µg/m³ (41LEB2), tegen respectievelijk 303 µg/m³ en 465 µg/m³ op niet-werkdagen.

Voor een regelmatige tunnelgebruiker, 220 werkende dagen per jaar met zowel ochtend- als avondspits, kan de jaarlijkse blootstelling aan NO₂ met ongeveer 6 à 7 µg/m³ toenemen. Voor een bewoner van een residentiële wijk, met een jaargemiddelde concentratie van 30 à 32 µg/m³ NO₂, zou dit een toename betekenen van de jaargemiddelde blootstelling met ca. 20%. Ook voor deze bewoners dreigt de jaarlijkse blootstelling aan NO₂ de grenswaarde voor omgevingslucht (jaargemiddelde niet hoger dan 40 µg/m³ vanaf 2010) te benaderen of te overschrijden.

In de periode 2006-2012 worden in beide meetposten hogere NO₂-waarden vastgesteld dan tijdens de periode 2003-2005. De concentraties voor NO₂ waren in 2012 lager dan in 2011 of 2010. Voor CO wordt geen verdere daling van de gemiddelde concentratie vastgesteld.

Het concentratieniveau in de tunnel is beduidend hoger dan in de omgevingslucht. Voor CO en NO zijn de gemiddelde concentraties in de tunnel ruim 10 maal hoger en voor NO₂ ongeveer 5 tot 10 maal hoger dan op verkeersdrukke plaatsen in de buitenlucht.

Overschrijdingen: Het aantal piekwaarden voor NO₂, nl. de overschrijdingen van de drempelwaarde van **1.000 µg/m³** als **20-minuutsgemiddelde**, is het hoogst voor het meetpunt richting basiliek. Over het kalenderjaar 2012 worden er 1.588 overschrijdingen in 194 dagen vastgesteld tegenover 710 in 119 dagen op de meetpost richting centrum. Voor de meetpost richting basiliek betekent dit een afname van het aantal overschrijdingen met ongeveer 34% tegenover het jaar 2011, toen er 2.543 perioden in 218 dagen werden vastgesteld. Voor de meetpost richting centrum is het aantal overschrijdingen met ongeveer 36% afgenomen: 710 perioden in 119 dagen in 2012 tegenover 1.103 perioden in 159 dagen in 2011.

In de meetpost richting centrum komen de piekwaarden meestal voor op werkdagen tijdens de ochtendspits en in mindere mate tijdens de dag of de (late) namiddag. Voor de meetpost richting basiliek komen de overschrijdingen vooral voor tijdens de avondspits. De overschrijdingen tijdens het weekeinde doen zich vooral voor tijdens de namiddag of de vooravond. Het aantal piekwaarden kan wellicht verminderd worden indien het signaal van de gemeten NO₂-concentratie mee zou opgenomen worden in het algoritme, dat instaat voor het opstarten van de ventilatie in de tunnel.

In de meetpost richting basiliek wordt de NO₂-drempel van **400 µg/m³** als **uurwaarde** frequent overschreden: 355 à 503 uurwaarden per maand, 23 à 31 dagen per maand of gemiddeld 15 uurwaarden per dag. In de meetpost richting centrum wordt deze drempel minder vaak overschreden: 116 à 263 uurwaarden per maand, 17 tot 30 dagen per maand of gemiddeld 6 uurwaarden per dag. Om het aantal overschrijdingen van dit niveau te laten dalen, is een meer permanente ventilatie noodzakelijk.

Gemiddeld dagverloop en weekverloop: op beide meetposten is de concentratie van alle gemeten parameters (NO₂, NO en CO) gemiddeld hoger op werkdagen en gemiddeld hoger op zaterdag dan op zondag. In de meetpost richting centrum wordt, voor de gemiddelde werkdag van de winterperiode *oktober 2012 – maart 2013*, een duidelijke ochtendpiek vastgesteld. De ochtendpiek is ook aanwezig tijdens de zomerperiode *april – september 2012*.

In de meetpost richting basiliek is er, voor de werkdagen tijdens de winterperiode 2012/2013, een geringe verhoging van de concentratie tijdens de ochtendspits. In de late namiddag tot de avond is er permanent een hogere concentratie. Voor NO en NO₂ is er geen sprake van een uitgesproken piekconcentratie. De concentraties blijven op een relatief hoog niveau tijdens de daluren.

Autoluwe zondag: op zondag 16 september 2012 werd, in het kader van een Europese actie, door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest reeds voor de elfde maal een autoluwe zondag georganiseerd. Tussen 9 en 19 h lokale tijd (7 tot 17 h UT) was het gemotoriseerde privé vervoer nagenoeg integraal verboden over het totale grondgebied van het Gewest.

Uit het dagverloop van de concentraties kan opgemaakt worden dat, tijdens de sperperiode van de autoluwe zondag, de concentraties in de tunnel drastisch lager zijn dan op een gemiddelde zondag.

Inhoudstafel

Metingen Luchtkwaliteit in de Leopold II tunnel	1
1. Meetposten	3
2. Meetprogramma	3
3. Reglementering	5
4. Resultaten	6
4.1 Grafische Evolutie van de meetwaarden	6
4.2 Cumulatieve Frequentieverdeling	11
4.3 Overschrijdingen	45
4.4 Gemiddeld dagverloop	60
4.5 Gemiddeld weekverloop	67
4.6 Resultaten voor een autoluwe zondag	74
4.7 Vergelijking Tunnel en Meetposten Verkeer	81
Samenvatting	83