

## Kruidachtige planten

Lijst van inheemse soorten of niet-invasieve soorten die aangepast zijn aan de lokale omgeving en die kunnen worden aangeplant rond gebouwen in (voor)stedelijke gebieden

Franse naam	Wetenschappelijke naam	Inheemse soort	Duurzaamheid	Blootstelling	Bodemtype (vochtigheid)	Hoogte (cm)	Bloei	Belang voor de biodiversiteit	Landschappelijke/nutswaarde	Aandachtspunten
Aalbes	<i>Ribes rubrum</i>	ja	V	halfschaduw	normaal	100 - 150	april - mei	Interessant voor wilde bijen en voor vogels die rood fruit eten.	Eetbare vruchten. Vruchtvorming in juli - augustus.	
Adderwortel	<i>Persicaria bistorta</i>	ja	V	zon tot halfschaduw	normaal tot vochtig	20 - 80	mei - oktober	Interessant voor wilde bijen en vlinders: waardplant voor de rups van de blauwe vuurvliinder.		
Akkerdistel	<i>Cirsium arvense</i>	ja	V	zon	normaal tot droog	50 - 100	juli - september	Interessant voor wilde bijen en vlinders: waardplant voor de rups van de distelvlinder.		
Akkerklokje	<i>Campanula rapunculoides</i>	ja	V	zon tot halfschaduw	normaal	30 - 60	juni - augustus	Interessant voor wilde bijen.		
Akkervergeet-mijnietje	<i>Myosotis arvensis</i>	ja	E	halfschaduw	normaal	10 - 40	april - oktober			
Akkerwinde	<i>Convolvulus arvensis</i>	ja	V	zon	normaal tot droog	20 - 100	juni - oktober			
Basilicum	<i>Ocimum basilicum</i>	nee	E	zon	normaal	30 - 40	juli - september	Interessant voor wilde bijen.	Specerijplant.	Exotische plant die voornamelijk in potten of in de tuin wordt gekweekt.
Beemdkroon	<i>Knautia arvensis</i>	ja	V	zon	normaal tot droog	20 - 80	juni - september	Interessant voor vlinders, vogels en veel wilde bijen.		
Beklierde duizendknoop	<i>Persicaria lapathifolia</i>	ja	E	zon tot halfschaduw	normaal	20 - 80	juli - september			

Frans naam	Wetenschappelijke naam	Inheemse soort	Duurzaamheid	Blootstelling	Bodemtype (vochtigheid)	Hoogte (cm)	Bloei	Belang voor de biodiversiteit	Landschappelijke/nutswaarde	Aandachtspunten
Bermooievaarsbek	<i>Geranium pyrenaicum</i>	ja	V	zon halfschaduw schaduw	normaal	20 - 60	mei - september	Interessant voor wilde bijen.	Kan worden gebruikt als bodembedekker.	
Bieslook	<i>Allium schoenoprasum</i>	nee	V	zon	normaal	20 - 50	juni - oktober	Interessant voor wilde bijen.	Specerijplant.	Exotische plant die voornamelijk in potten of in de tuin wordt gekweekt.
Boerenwormkruid	<i>Tanacetum vulgare</i>	ja	V	zon	normaal tot droog	50 - 120	april - oktober	Interessant voor veel wilde bijen.		
Borstelkrans	<i>Clinopodium vulgare</i>	ja	V	zon	normaal tot droog	80 - 100	juli - september	Interessant voor sommige vlinders en sommige wilde bijen.		
Boskortsteel	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	ja	V	halfschaduw	normaal	50 - 100	juni - september	Interessant voor vlinders: waardplant voor de rups van het groot dikkopje en het bont zandoogje.		
Bosvergeet-mijnietje	<i>Myosotis sylvatica</i>	ja	T	schaduw	normaal	10 - 50	april - juni	Interessant voor vlinders en wilde bijen.		
Boszegge	<i>Carex sylvatica</i>	ja	V	halfschaduw	normaal	30 - 80	mei - juli	Interessant voor vlinders: waardplant voor de rups van het bont zandoogje.		
Cipreswolfsmelk	<i>Euphorbia cyparissias</i>	ja	V	zon	droog	20 - 80	april - september	Interessant voor wilde bijen.	Discrete geel-groene bloeiwijzen	Produceert een wit melksap dat lichte brandwonden kan veroorzaken.
Citroengele honingklaver	<i>Melilotus officinalis</i>	genaturaliseerd	T	zon	normaal	40 - 80	mei - september	Interessant voor wilde bijen omdat de bloemen zeer rijk zijn aan nectar.	Gele bloemen in lange trossen. Winterharde bladeren. Geneeskrachtige plant, ook gebruikt als groenbemester in de moestuin (verrijking van de bodem met stikstof).	Groeit op alle soorten grond.

Frans naam	Wetenschappelijke naam	Inheemse soort	Duurzaamheid	Blootstelling	Bodemtype (vochtigheid)	Hoogte (cm)	Bloei	Belang voor de biodiversiteit	Landschappelijke/nutswaarde	Aandachtspunten
Dagkoekoeksbloem	<i>Silene dioica</i>	ja	V	halfschaduw	normaal	20 - 90	mei - oktober	Interessant voor vlinders en wilde bijen omdat de bloemen zeer rijk zijn aan nectar.		
Dille	<i>Anethum graveolens</i>	ja	E	halfschaduw	droog	60 - 70	juli - augustus	Interessant voor bestuivers in het algemeen.	Specerijplant.	Exotische plant die voornamelijk in potten of in de tuin wordt gekweekt.
Donderblad	<i>Sempervivum tectorum</i>	genaturaliseerd / niet BHG	V	zon	droog	20 - 50	juni - augustus	Interessant voor veel wilde bijen.	Geschikt voor rotstuinen, oude muren, groendaken.	Geen inheemse plant van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor te behouden voor bepaalde specifieke toepassingen zoals groendaken.
Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>	ja	V	zon	normaal	10 - 50	juni - november	Interessant voor vogels en veel wilde bijen.	Grote plant met witte bloemschermen en fijn ingesneden bladeren.	Pas op voor de vele geteelde variëteiten die vermeden moeten worden.
Echt bitterkruid	<i>Picris hieracioides</i>	ja	T	zon	droog	30 - 80	juli - september	Interessant voor wilde bijen.		
Echte guldenroede	<i>Solidago virgaurea</i>	ja	V	zon tot halfschaduw	normaal	20 - 100	juli - oktober	Interessant voor bepaalde soorten vlinders en wilde bijen.		
Echte marjolein	<i>Oreganum majorana</i>	nee	V	zon	normaal	30 - 50	juli - oktober		Specerijplant.	Exotische plant die voornamelijk in potten of in de tuin wordt gekweekt.
Echte tijm	<i>Thymus vulgaris</i>	nee	V	zon	droog	10 - 40	mei - juli	Interessant voor vogels, vlinders en wilde bijen.	Wordt gebruikt als bodembedekker, vooral bij de herbeplanting van verhard terrein.	Exotische plant die voornamelijk in potten of in de tuin wordt gekweekt.
Echte valeriaan	<i>Valeriana officinalis</i>	ja	V	zon tot halfschaduw	normaal	50 - 100	mei - juli	Interessant voor vlinders en wilde bijen omdat de bloemen zeer rijk zijn aan nectar.		

Frans naam	Wetenschappelijke naam	Inheemse soort	Duurzaamheid	Blootstelling	Bodemtype (vochtigheid)	Hoogte (cm)	Bloei	Belang voor de biodiversiteit	Landschappelijke/nutswaarde	Aandachtspunten
Engels raaigras	<i>Lolium perenne</i>	ja	V	zon tot halfschaduw	normaal	20 - 60	mei - oktober	Interessant voor vlinders: waardplant voor de rups van het groot dikkopje.		
Geel nagelkruid	<i>Geum urbanum</i>	ja	V	halfschaduw	kosten	20 - 60	mei - september	Interessant voor sommige vlinders en andere insecten.		
Gehoornde klaverzuring	<i>Oxalis corniculata</i>	genaturalis eerd	V	halfschaduw tot zon	normaal tot droog	3 - 15	april - oktober		Plant die groene tapijten of bosjes vormt, goede bodembedekker. Extensief groendak. Courante stoeplant.	
Gele dovenetel	<i>Lamium galeobdolon</i>	ja	V	halfschaduw	normaal	20 - 60	mei - juli	Interessant voor veel wilde bijen.		Vermijd siervormen, die invasief kunnen worden.
Gewone agrimonie	<i>Agrimonia eupatoria</i>	ja	V	halfschaduw	droog tot normaal	30 - 60	juni - september	Interessant voor vlinders, wilde bijen en zweefvliegen.	Lange aren met gele bloempjes. Geneeskrachtige plant.	Houdt van maaiveiden, braakliggend grasland, bermen ...
Gewone brunel	<i>Prunella vulgaris</i>	ja	V	halfschaduw	normaal	10 - 40	mei - september	Interessant voor wilde bijen.	Paarse bloempjes.	
Gewone ereprijs	<i>Veronica chamaedrys</i>	ja	V	zon	normaal	20 - 50	april - juni	Interessant voor wilde bijen.		
Gewone reigersbek	<i>Erodium cicutarium cicutarium</i>	ja	E/T	zon	normaal tot droog	10 - 30	maart - augustus		Plant die zich over de grond kan verspreiden en dus als bodembedekker kan worden gebruikt.	
Gewone rolklaver	<i>Lotus corniculatus</i>	ja	V	zon	normaal tot droog	30 - 40	mei - september	Interessant voor wilde bijen en vlinders: waardplant voor de rups van het icaruswitblauwtje. De bloemen zijn zeer rijk aan nectar.		
Gewone Salomonszegel	<i>Polygonatum multiflorum</i>	ja	V	halfschaduw tot schaduw	normaal	30 - 60	april - juni			Plant van het onderhoud.

Frans naam	Wetenschappelijke naam	Inheemse soort	Duurzaamheid	Blootstelling	Bodemtype (vochtigheid)	Hoogte (cm)	Bloei	Belang voor de biodiversiteit	Landschappelijke/nutswaarde	Aandachtspunten
Gewone smeerwortel	<i>Symphitum officinale</i>	ja	V	zon tot halfschaduw	normaal	40 - 100	mei - juli	Interessant voor veel wilde bijen.	Nuttig voor de bereiding van plantengier. Plant die als bodembedekker kan worden gebruikt. Geneeskrachtige plant.	
Gewoon biggenkruid	<i>Hypochaeris radicata</i>	ja	V	zon	normaal tot droog	15 - 50	mei - september	Interessant voor veel vlinders en veel soorten wilde bijen.		
Gewoon speenkruid	<i>Ficaria verna</i>	ja	V	halfschaduw	normaal	5 - 30	februari - mei	Interessant voor vele soorten vlinders en wilde bijen.	Gele bloemen die op boeterbloemen lijken. Interessante vroege bloei voor de eerste bestuivers.	
Gewoon struisgras	<i>Agrostis capillaris</i>	ja	V	zon tot	normaal	10 - 70	juni - september	Interessant voor vlinders: waardplant voor de rups van het oranje zandoogje en het zwartsprietdikkopje.		Pas op voor de vele geteelde variëteiten die vermeden moeten worden.
Giersch	<i>Aegopodium podagraria</i>	ja	V	halfschaduw tot schaduw	normaal	30 - 80	mei - augustus	Interessant voor vlinders en voor veel wilde bijen, jachtwespen, kevers ...	Witte bloemen. Krachtige bodembedekker die goed onder bomen groeit.	
Gladde witbol	<i>Holcus mollis</i>	ja	V	halfschaduw	normaal	30 - 80	juni - september	Interessant voor vlinders: waardplant voor de rups van de hanenpoot en het zwartsprietdikkopje.		
Grasklokje	<i>Campanula rotundifolia</i>	ja	V	zon tot halfschaduw	normaal tot droog	10 - 60	juni - september	Interessant voor veel wilde bijen.		
Groot hoefblad	<i>Petasites hybridus</i>	ja	V	zon	normaal	10 - 100	maart - mei	Interessant voor vele soorten insecten, waaronder vlinders en wilde bijen.		
Groot kaasjeskruid	<i>Malva sylvestris</i>	ja	T	zon	normaal tot droog	30 - 60	juni - september	Interessant voor vlinders: waardplant voor de rups van de distelvlinder.		



Frans naam	Wetenschappelijke naam	Inheemse soort	Duurzaamheid	Blootstelling	Bodemtype (vochtigheid)	Hoogte (cm)	Bloei	Belang voor de biodiversiteit	Landschappelijke/nutswaarde	Aandachtspunten
Groot streepzaad	<i>Crepis biennis</i>	ja	T	zon	normaal tot droog	30 - 100	mei - juli	Interessant voor veel vlinders en veel wilde bijen.		
Grote brandnetel	<i>Urtica dioica</i>	ja	V	halfschaduw	normaal	50 - 100	juni - oktober	Vlinders: volwassen honingverzamelaars en waardplant voor de rups van het landkaartje, de kleine vos, de gehakelde aurelia en de atalanta.		
Grote kaardenbol	<i>Dipsacus fullonum</i>	ja	T	zon	normaal	90 - 120	mei - augustus	Interessant voor vlinders in het algemeen omdat de bloemen zeer rijk zijn aan nectar. Vogels lessen er hun dorst of voeden zich met de zaden (putter).		
Grote kattenstaart	<i>Lythrum salicaria</i>	ja	V	zon	normaal	50 - 100	juni - september	Interessant voor vele soorten vlinders en wilde bijen.	Magentakleurige bloemen in lange aren.	
Grote klaproos	<i>Papaver rhoeas</i>	ja	E	zon	normaal tot droog	30 - 60	mei - juli	Interessant voor veel wilde bijen.		
Grote klit	<i>Arctium lappa</i>	ja	T	zon	normaal	80 - 120	juli - augustus	Interessant voor vlinders en wilde bijen.		Aanwezig in Brussel op braakgrond en in perifere gebieden. Nitrofiële plant.
Grote wederik	<i>Lysimachia vulgaris</i>	ja	V	zon tot halfschaduw	normaal tot vochtig	50 - 100	juni - augustus	Interessant voor vlinders en wilde bijen.	Vochtig grasland.	
Grote weegbree	<i>Plantago major</i>	ja	V	zon tot halfschaduw	normaal	15 - 40	mei - november		Geneeskrachtige plant.	
Grote zandkool	<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	ja	V	zon	droog	30 - 80	mei - september	Interessant voor wilde bijen en vlinders: waardplant voor het klein gaderd witje.	Eetbare plant.	

Frans naam	Wetenschappelijke naam	Inheemse soort	Duurzaamheid	Blootstelling	Bodemtype (vochtigheid)	Hoogte (cm)	Bloei	Belang voor de biodiversiteit	Landschappelijke/nutswaarde	Aandachtspunten
Hemelsleutel	<i>Sedum telephium / Hylotelephium telephium</i>	ja / niet BHG	V	zon	droog	30 - 60	juli - september			Geen inheemse plant van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor te behouden voor bepaalde specifieke toepassingen zoals groendaken.
Hemelsleutel	<i>Hylotelephium telephium</i>	ja	V	zon	droog	30 - 60	juli - september	Interessant voor vele soorten vlinders en wilde bijen.	Interessante plant voor groendaken.	
Herderstasje	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	ja	E	zon tot halfschaduw	normaal	10 - 20	maart - december	Interessant voor vlinders en andere insecten.		Pionierplant, aanwezig in vele habitats.
Herik	<i>Sinapsis arvensis</i>	ja	E	zon tot halfschaduw	normaal	30 - 80	mei - september	Interessant voor vlinders: waardplant voor de rups van het groot koolwitje en kool en het klein geaderd witje.		
Hondsdrif	<i>Glechoma hederacea</i>	ja	V	halfschaduw	normaal tot droog	5 - 25	maart - mei	Interessant voor wilde bijen aan het einde van het seizoen en voor vogels.		
Hopklaver	<i>Medicago lupulina</i>	ja	E/T	zon	normaal tot droog	20 - 40	mei - augustus	Interessant voor wilde bijen en vlinders: waardplant voor de rups van het icaruswitblauwtje.		
IJle dravik	<i>Anisantha sterilis</i>	ja	E	zon tot halfschaduw	normaal tot droog	30 - 80	mei - augustus	Interessant voor vlinders: waardplant voor de rups van het groot dikkopje.		
Ijzerhard	<i>Verbena officinalis</i>	ja	V	zon	normaal	40 - 80	juni - oktober	Interessant voor vele soorten vlinders en wilde bijen.		
Jakobskruiskruid	<i>Jacobaea vulgaris</i>	ja	V	zon	normaal tot droog	40 - 120	juni - september	Interessant voor wilde bijen en vlinders: waardplant voor de rups van de sint-jacobsvlinder. De bloemen zijn zeer rijk aan nectar.		Giftige plant voor paarden en runderen.

Franse naam	Wetenschappelijke naam	Inheemse soort	Duurzaamheid	Blootstelling	Bodemtype (vochtigheid)	Hoogte (cm)	Bloei	Belang voor de biodiversiteit	Landschappelijke/nutswaarde	Aandachtspunten
Kamgras	<i>Cynosurus cristatus</i>	ja	V	zon	normaal	30 - 80	mei - juli	Interessant voor vlinders: waardplant voor de procris.		
Kandelaartje	<i>Saxifraga tridactylites</i>	ja	E	zon	normaal	2 - 12	maart - mei			Liefst op kalkachtige grond.
Kleine maagdenpalm	<i>Vinca minor</i>	ja	V	halfschaduw schaduw	normaal	15 - 30	maart - mei	Interessant voor vlinders en wilde bijen.	Kan worden gebruikt als bodembedekker.	
Kleine veldkers	<i>Cardamine hirsuta</i>	ja	E	halfschaduw	normaal	10 - 20	juni - september	Interessant voor vlinders: waardplant van de rups van het oranjetipje en van het klein geaderd witje.		
Klimop	<i>Hedera helix</i>	ja	V	schaduw	normaal	30 m	september - oktober	Interessant voor vlinders: kan de citroenvlinder herbergen om te overwinteren. Interessant voor wilde bijen aan het einde van het seizoen, vooral voor de klimopbij. Wordt door veel vogels bezocht, vooral om te nestelen.	Liaan, ook een uitstekende bodembedekker.	
Knoopkruid	<i>Centaurea jacea (syn. thuillieri)</i>	ja	V	zon	normaal	30 - 60	mei - juni	Interessant voor vogels en veel wilde bijen. De bloemen zijn zeer rijk aan nectar.	Fijn ingesneden, zeer decoratieve paarse bloemen.	Pas op voor gekweekte variëteiten.
Knopig helmkruid	<i>Scrophularia nodosa</i>	ja	V	halfschaduw	normaal	40 - 80	juni - september	Interessant voor veel insecten.		
Koninginnekruid	<i>Eupatorium cannabinum</i>	ja	V	zon tot halfschaduw	normaal	80 - 120	juli - oktober	Interessant voor sommige vlinders en sommige wilde bijen.		
Koningskaars	<i>Verbascum thapsus</i>	ja	T	zon tot halfschaduw	droog	50 - 200	juni - november	Interessant voor wilde bijen, diverse andere insecten (kevers...) en vlinders: waardplant voor de rups van de kuifvlinder.	Gele bloemen op lange aren. De bloei is lang en overvloedig.	



Frans naam	Wetenschappelijke naam	Inheemse soort	Duurzaamheid	Blootstelling	Bodemtype (vochtigheid)	Hoogte (cm)	Bloei	Belang voor de biodiversiteit	Landschappelijke/nutswaarde	Aandachtspunten
Korenbloem	<i>Centaurea cyanus</i>	ja / niet BHG	E	zon	normaal	30 - 60	juni - augustus	Interessant voor vogels en veel wilde bijen.	Zeer decoratieve blauwe bloem.	De plant is niet inheems in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar is aanwezig in vele mengsels van bloemenweiden. Vermijd de gekweekte variëteiten met een dichtere bloeiwijze, die mogelijk steriel en niet interessant voor bestuivers zijn.
Kropaar	<i>Dactylis glomerata</i>	ja	V	zon tot halfschaduw	droog	20 - 100	april - september	Interessant voor vlinders: waardplant voor de rups van het groot dikkopje en het bont zandoogje.	Kropaar	
Kruipend zenegroen	<i>Ajuga reptans</i>	ja	V	halfschaduw	normaal tot vochtig	10 - 40	mei - juni	Interessant voor vlinders en wilde bijen omdat de bloemen zeer rijk zijn aan nectar.	Blauw-paarse bloemen, minder vaak roze of wit. Goede bodembedekker op vochtige grond in halfschaduw, geschikt voor de meeste grondsoorten.	Voortplanting door uitlopers, een plant die zich vrij goed kan verspreiden.
Kruipende boterbloem	<i>Ranunculus repens</i>	ja	V	halfschaduw	normaal	20 - 50	mei - september	Interessant voor vlinders en veel wilde bijen.		
Kruisbes	<i>Ribes uva-crispa</i>	ja / niet BHG	V	halfschaduw	normaal	101 - 150	april - mei	Interessant voor vele soorten vlinders en wilde bijen.	Eetbare vruchten. Vruchtvorming in juli - augustus.	Geen inheemse plant van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vooral in privé-tuinen te planten.
Lelietje-van-dalen	<i>Convallaria majalis</i>	ja	V	halfschaduw	normaal tot droog	10 - 20	april - juni		Mooie klokvormige bloeiwijzen.	Zeer giftige plant. Groeit voornamelijk in droog loofhout. Pas op voor de gekweekte roze variëteit.
Liggende klaver	<i>Trifolium campestre</i>	ja	E	zon	normaal tot droog	5 - 50	mei - september	Interessant voor vlinders omdat de bloemen zeer rijk zijn aan nectar.		

Frans naam	Wetenschappelijke naam	Inheemse soort	Duurzaamheid	Blootstelling	Bodemtype (vochtigheid)	Hoogte (cm)	Bloei	Belang voor de biodiversiteit	Landschappelijke/nutswaarde	Aandachtspunten
Look zonder look	<i>Alliaria petiolata</i>	ja	T	zon tot	normaal tot vochtig	10 - 90	april - juni	Interessant voor wilde bijen en vlinders: waardplant voor de rups van het oranjetipje, van het groot koolwitje en het klein geaderd witje.	Witte bloempjes. Plant die gemakkelijk groeit onder bomen en struiken, onder heggen of aan de voet van muren.	
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	genaturaliseerd	V	zon	normaal tot droog	30 - 80	juni - september	Interessant voor wilde bijen en vlinders: waardplant voor de rups van het icaruswitblauwtje en het boomblauwtje.		
Mannetjesereprijs	<i>Veronica officinalis</i>	ja	V	halfschaduw	normaal	10 - 40	mei - juli	Interessant voor wilde bijen.		
Margriet	<i>Leucanthemum vulgare</i>	ja	V	zon	normaal	30 - 60	mei - juni	Interessant voor vlinders en wilde bijen omdat de bloemen zeer rijk zijn aan nectar.		
Melganzenvoet	<i>Chenopodium album</i>	ja	E	zon	normaal tot droog	20 - 100	juni - september	Interessant voor sommige vlinders en andere insecten zoals kevers ...		
Moerasspirea	<i>Filipendula ulmaria</i>	ja	V	zon	normaal	50 - 120	juni - augustus	Interessant voor vlinders omdat de bloemen zeer rijk zijn aan nectar. Ook interessant voor vogels.		
Muizenoor	<i>Hieracium pilosella</i>	ja	V	zon	droog	1 à 3m	juni - juli	Interessant voor bepaalde soorten wilde bijen.		
Muskuskaasjeskruid	<i>Malva moschata</i>	ja	V	zon	normaal	30 - 60	juni – september	Interessant voor vlinders en wilde bijen.	Elegante plant met lichtroze bloemen, droge en zonnige grond.	Pas op voor de vele gekweekte variëteiten.
Muurpeper	<i>Sedum acre</i>	ja	V	zon	droog	5 - 15	mei - augustus	Interessant voor vlinders en wilde bijen.	Geschikt voor rotstuinen, oude muren, groendaken, als bodembedekker, vooral tussen graven op begraafplaatsen ... Bestand tegen warmte en koude.	

Frans naam	Wetenschappelijke naam	Inheemse soort	Duurzaamheid	Blootstelling	Bodemtype (vochtigheid)	Hoogte (cm)	Bloei	Belang voor de biodiversiteit	Landschappelijke/nutswaarde	Aandachtspunten
Paardebloem	<i>Taraxacum sp.</i>	ja	V	zon	normaal	10 - 50	maart - november	Interessant voor vogels, vlinders en wilde bijen (bloemen zeer rijk aan nectar).		Past zich aan vele grondsoorten aan.
Paarse dovenetel	<i>Lamium purpureum</i>	ja	E	zon tot halfschaduw	normaal	10 - 20	maart - december	Interessant voor veel vlinders en wilde bijen, vooral in het voorseizoen.	Kan het hele jaar door bloeien in gunstige omgevingen.	
Peen	<i>Daucus carota</i>	ja	T	zon	normaal	20 - 100	mei - september	Interessant voor wilde bijen, diverse andere insecten en vlinders: waardplant voor de rups van de koninginnenpage.		
Penningkruid	<i>Lysimachia nummularia</i>	ja	V	halfschaduw	normaal	10 - 60	juni - augustus	Interessant voor wilde bijen.		
Pinksterbloem	<i>Cardamine pratensis</i>	ja	V	halfschaduw	normaal	20 - 50	april - juni	Interessant voor vlinders: waardplant van de rups van het oranjetipje en van het klein geaderd witje.		Verdraagt een vrije grote verscheidenheid aan habitats.
Rapunzelklokje	<i>Campanula rapunculus</i>	ja	T	zon	normaal	20 - 50	juni - oktober	Interessant voor wilde bijen.		
Reuzenzwenkgras	<i>Festuca gigantea</i>	ja	V	schaduw	vochtig	50 - 150	juni - september	Interessant voor vlinders: waardplant voor de rups van het bont zandogje.		
Rietzwenkgras	<i>Festuca arundinacea</i>	ja	V	zon	normaal	60 - 100	mei - juli	Interessant voor vlinders: waardplant voor de rups van het groot dikkopje.		
Robertskruid	<i>Geranium robertianum</i>	ja	E	halfschaduw	normaal	20 - 60	mei - augustus	Interessant voor vogels en veel wilde bijen.	Kan worden gebruikt als bodembedekker.	

Frans naam	Wetenschappelijke naam	Inheemse soort	Duurzaamheid	Blootstelling	Bodemtype (vochtigheid)	Hoogte (cm)	Bloei	Belang voor de biodiversiteit	Landschappelijke/nutswaarde	Aandachtspunten
Rode klaver	<i>Trifolium pratense</i>	ja	V	zon	normaal	10 - 50	mei - oktober	Interessant voor wilde bijen en vlinders: waardplant voor de rups van het icaruswitblauwtje. De bloemen zijn zeer rijk aan nectar.		
Rood zwenkgras	<i>Festuca rubra</i>	ja	V	halfschaduw tot zon	normaal	30 - 80	mei - juli	Interessant voor vlinders: waardplant voor de rups van het oranje zandogje.		
Roze vetkruid	<i>Sedum spurium / Phedimus spurius</i>	genaturalis eerd	V	zon	droog	15 - 30	juli - augustus	Interessant voor wilde bijen.	Roze stervormige bloemen. Geschikt voor rotstuinen, oude muren, groendaken, bodembedekking. Zeer goed bestand tegen warmte en koude.	
Rozemarijn	<i>Rosmarinus officinalis</i>	nee	V	zon	droog	30 - 100	februari - mei	Interessant voor veel wilde bijen.	Specerijplant.	Exotische plant die voornamelijk in potten of in de tuin wordt gekweekt. Verdraagt vorst, als de bodem niet vochtig is.
Rozetsteenkens	<i>Arabidopsis arenosa</i>	ja	T	halfschaduw	droog	20 - 80	april		Vooral te gebruiken op extensieve groendaken.	
Ruig klokje	<i>Campanula trachelium</i>	ja	V	halfschaduw	normaal	30 - 100	juli - augustus	Interessant voor veel wilde bijen.		
Ruwe smele	<i>Deschampsia cespitosa</i>	ja	V	halfschaduw	normaal	30 - 150	juni - augustus	Interessant voor vlinders: waardplant voor de rups van het bont zandogje.		
Schaduwgras	<i>Poa nemoralis</i>	ja	V	halfschaduw	normaal	20 - 80	juni - oktober	Interessant voor vlinders: waardplant voor de rups van het groot dikkopje.		

Frans naam	Wetenschappelijke naam	Inheemse soort	Duurzaamheid	Bloodstelling	Bodemtype (vochtigheid)	Hoogte (cm)	Bloei	Belang voor de biodiversiteit	Landschappelijke/nutswaarde	Aandachtspunten
Schapenzuring	<i>Rumex acetosella</i>	ja	V	zon	normaal tot droog	10 - 50	april - september	Interessant voor vlinders: waardplant voor de kleine vuurvliinder.	Wortelstokplant die zich gemakkelijk verspreidt en kan worden gebruikt als bodembedekker.	
Scherpe boterbloem	<i>Ranunculus acris</i>	ja	V	zon tot halfschaduw	normaal	30 - 60	mei - september	Interessant voor wilde bijen.		
Schijfkamille	<i>Matricaria discoidea</i>	genaturalis eerd	E	zon	normaal tot droog	20 - 40	juni - november			
Sint Janskruid	<i>Hypericum perforatum</i>	ja	V	zon	normaal	20 - 80	juni - september	Interessant voor vlinders, wilde bijen en kevers.		
Slangenkruid	<i>Echium vulgare</i>	ja	T	zon	normaal tot droog	40 - 90	mei - oktober	Interessant voor vogels en voor veel wilde bijen.	Bloemen die variëren van roze tot felblauw wanneer ze rijp zijn. De stengels zijn behaard. Kan worden gebruikt op extensieve groendaken.	
Slanke sleutelbloem	<i>Primula elatior</i>	ja	V	halfschaduw	normaal	10 - 30	maart - mei	Interessant voor bestuivers omdat de bloemen zeer rijk zijn aan nectar.	Slanke sleutelbloem	
Smalle weegbree	<i>Plantago lanceolata</i>	ja	V	zon tot halfschaduw	normaal	10 - 60	april - oktober	Interessant voor vlinders: waardplant voor de rups van de distelvlinder.		
Speerdistel	<i>Cirsium vulgare</i>	ja	T	zon	normaal tot droog	50 - 150	juni - oktober	Interessant voor wilde bijen en vlinders: waardplant voor de rups van de distelvlinder.		
Stinkende ballote	<i>Ballota nigra</i>	ja	V	zon	normaal	30 - 80	juni - september	Interessant voor wilde bijen.		



Frans naam	Wetenschappelijke naam	Inheemse soort	Duurzaamheid	Blootstelling	Bodemtype (vochtigheid)	Hoogte (cm)	Bloei	Belang voor de biodiversiteit	Landschappelijke/nutswaarde	Aandachtspunten
Stinkende gouwe	<i>Chelidonium majus</i>	ja	V	zon tot halfschaduw	normaal	30 - 80	mei - september	Interessant voor vlinders, wilde bijen en andere insecten.		Bijtend oranje-geel melksap.
Straatgras	<i>Poa annua</i>	ja	E	zon	normaal	5 - 30	mei-augustus	Interessant voor vlinders: waardplant voor de rups van het oranje zandoogje, het bruin zandoogje, het bont zandoogje en de procris.		
Tripmadam	<i>Sedum rupestre</i>	ja / niet BHG	V	zon	droog	15 - 30	juni - augustus	Interessant voor vlinders en wilde bijen.	Geschikt voor rotstuinen, oude muren, groendaken, als bodembedekker, vooral tussen graven op begraafplaatsen ... Bestand tegen warmte en koude.	Geen inheemse plant van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor te behouden voor bepaalde specifieke toepassingen zoals groendaken.
Tuinwolfsmelk	<i>Euphorbia peplus</i>	ja	E	zon	normaal tot droog	10 - 30	heel het jaar	Interessant voor vlinders en wilde bijen.	Discrete geel-groene bloeiwijzen	Produceert een wit melksap dat lichte brandwonden kan veroorzaken.
Valse salie	<i>Teucrium scorodonia</i>	ja	V	halfschaduw	normaal	30 - 80	juni - september	Interessant voor sommige wilde bijen.		
Varkensgras	<i>Polygonum aviculare</i>	ja	E	zon tot halfschaduw	normaal	10 - 80	mei - november	Interessant voor de vogels die de zaden lusten.		
Veldbeemdgras	<i>Poa pratensis</i>	ja	V	zon	normaal	20 - 80	mei - augustus	Vlinders: volwassen honingverzamelaars en waardplant voor de rups van het oranje zandoogje en het groot dikkopje.		
Veldzuring	<i>Rumex acetosa</i>	ja	V	zon	normaal	30 - 100	mei - september	Interessant voor vlinders: waardplant voor de kleine vuurvlinder.		

Frans naam	Wetenschappelijke naam	Inheemse soort	Duurzaamheid	Blootstelling	Bodemtype (vochtigheid)	Hoogte (cm)	Bloei	Belang voor de biodiversiteit	Landschappelijke/nutswaarde	Aandachtspunten
Viltige basterdwederik	<i>Epilobium parviflorum</i>	ja	V	zon	normaal	30 - 80	juni - september	Interessant voor vlinders: waardplant voor de teunisbloempijlstaart.	Lichtroze bloempjes.	
Vingerhoedskruid	<i>Digitalis purpurea</i>	ja	T / V	halfschaduw	normaal	50 - 120	mei - september	Interessant voor vlinders en veel wilde bijen.	Zeer mooie roze-paarse bloeiwijzen in langwerpige trossen.	Zeer giftige plant.
Vlasbekje	<i>Linaria vulgaris</i>	ja	V	zon	normaal tot droog	30 - 80	juni - oktober	Interessant voor vlinders en wilde bijen.		
Vogelmuur	<i>Stellaria media</i>	ja	E	zon	normaal	5 - 40	heel het jaar			
Vogelwikke	<i>Vicia cracca</i>	ja	V	halfschaduw	normaal	30 - 200	juni - augustus	Interessant voor vele soorten vlinders en wilde bijen.		
Vroegeling	<i>Erophila verna / Draba verna</i>	ja	E	zon	normaal	5 - 15	maart - mei	Interessant voor vlinders (waardplant voor de rups van het oranjetipje) en de bestuivers aan het begin van het seizoen.		
Wilde cichorei	<i>Cichorium intybus</i>	ja	V	zon	normaal	10 - 100	juli - augustus	Interessant voor wilde bijen.		
Wilde marjolein	<i>Origanum vulgare</i>	ja	V	zon	normaal tot droog	20 - 40	juli - september	Interessant voor veel vlinders en wilde bijen.	Zeer geurige geneeskrachtige en aromatische plant.	
Wilde narcis	<i>Narcissus pseudo-narcissus</i>	ja	V	zon tot halfschaduw	normaal	20 - 40	maart - april			
Wilde reseda	<i>Reseda lutea</i>	ja	T	zon	normaal tot droog	25 - 50	mei - september	Interessant voor vlinders en veel wilde bijen.	Bermen, droge braakgrond, ruw grasland, spoorwegballast ...	
Wilgeroosje	<i>Chamerion angustifolium / Epilobium angustifolium</i>	ja	V	zon	normaal tot droog	30 - 200	juni - september	Interessant voor bestuivers in het algemeen en voor vogels.	Roze-rode bloemen. De vrucht vormt langwerpige capsules met zaden met zijdeachtige witte pluimpjes.	

Frans naam	Wetenschappelijke naam	Inheemse soort	Duurzaamheid	Blootstelling	Bodemtype (vochtigheid)	Hoogte (cm)	Bloei	Belang voor de biodiversiteit	Landschappelijke/nutswaarde	Aandachtspunten
Wit vetkruid	<i>Sedum album</i>	ja / niet BHG	V	zon	droog	10 - 30	juni - juli	Interessant voor vlinders en wilde bijen.	Geschikt voor rotstuinen, oude muren, groendaken, als bodembedekker, vooral tussen graven op begraafplaatsen ... Bestand tegen warmte en koude.	Geen inheemse plant van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor te behouden voor bepaalde specifieke toepassingen zoals groendaken.
Witte honingklaver	<i>Melilotus albus</i>	genaturaliseerd	T	zon	normaal	50 - 120	juni - september	Interessant voor wilde bijen.	Witte bloemen in lange trossen.	
Witte klaver	<i>Trifolium repens</i>	ja	V	zon tot halfschaduw	normaal	10 - 40	mei - oktober	Interessant voor wilde bijen en vlinders: waardplant voor de rups van het icaruswitblauwtje. De bloemen zijn zeer rijk aan nectar.	Witte bloemen.	
Wolfskers	<i>Atropa belladonna</i>	ja	V	halfschaduw	normaal	50 - 100	juni - augustus	Interessant voor wilde bijen.	Geneeskrachtige plant.	Zeer giftige plant.
Wouw	<i>Reseda luteola</i>	ja	T	zon	normaal tot droog	50 - 120	mei - september	Interessant voor vlinders en veel wilde bijen.	Bermen, droge braakgrond, ruw grasland, spoorwegballast ...	
Zacht vetkruid	<i>Sedum sexangulare</i>	ja / niet BHG	V	zon	droog	5 - 15	juli - augustus		Geschikt voor rotstuinen, oude muren, groendaken.	Geen inheemse plant van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor te behouden voor bepaalde specifieke toepassingen zoals groendaken.
Zilverschoon	<i>Potentilla anserina</i>	ja	V	halfschaduw	normaal	20 - 40	mei - september	Interessant voor bestuivers omdat de bloemen zeer rijk zijn aan nectar.	Zilverschoon	
Zwarte bes	<i>Ribes nigrum</i>	ja / niet BHG	V	zon	normaal	100 - 150	april - mei	Interessant voor vele soorten vlinders en wilde bijen.	Eetbare vruchten. Vruchtvorming in juli - augustus.	Geen inheemse plant van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vooral in privé-tuinen te planten.
Zwarte toorts	<i>Verbascum nigrum</i>	ja	V	halfschaduw	normaal	40 - 100	juli - september	Interessant voor insecten in het algemeen.	Gele bloemen met purperachtig hart.	

V = vaste (winterharde) plant  
A = eenjarige plant  
B = tweejarige plant